

RESULTADOS

Os resultados são apresentados na seguinte seqüência:

1. Resultados gerais, que incluem:
 - a) Brasil (as 27 capitais analisadas em conjunto)
 - b) As cinco regiões (analisadas no conjunto das capitais que compõem determinada região) e cada capital em separado
2. Comparações entre os levantamentos realizados pelo CEBRID
 - a) 1987, 1989, 1993, 1997 e 2004
 - b) 1997 e 2005Síntese das comparações entre os levantamentos
3. Estudo do uso das diferentes drogas, comparando-se Brasil e regiões
4. Comparações entre idades de primeiro uso de drogas no Brasil
5. Fatores familiares e pessoais associados ao uso de drogas (Brasil e regiões)
6. Comparações dos resultados com outros países

Observação:

A apresentação dos resultados segue um padrão para facilitar o entendimento deles. Assim, haverá sempre uma sinopse que pretende ressaltar os aspectos mais importantes de cada Tabela/Figura. Os algarismos em romanos da sinopse correspondem sempre ao número da Tabela/Figura para cada bloco de resultados.

RESULTADOS GERAIS

Brasil,

Regiões e Capitais



Área: 8.511.978,1km²

1. Informação da população

• População nas capitais brasileiras 39.461.480 habitantes ^(IBGE, 2004)

2. Estudantes

| Estudantes matriculados* | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ensino | Escolas Públicas | Escolas Privadas | Total |
| Fundamental** | 2.671.705 | 731.643 | 3.403.348 |
| Médio | 2.010.151 | 525.527 | 2.535.678 |
| Total | 4.681.856 | 1.257.170 | 5.939.026 |

*INEP-ME, 2004.

**Alunos matriculados no Ensino Fundamental a partir da 5ª série.

BRASIL

SINOPSE

- I – A amostra total foi constituída de 48.155 estudantes, sendo a maioria do sexo feminino (50,8%). A faixa etária predominante foi a de 13 a 15 anos com 36,3%; 71,6% dos estudantes pertenciam ao ensino fundamental. A defasagem escolar atingiu 45,9% dos alunos pesquisados. Somente 21,2% da amostra pertencia às classes sociais A ou B (Tabela 1).
- II – Observou-se maior defasagem escolar entre os estudantes que já tinham feito *uso na vida* de drogas ao comparar-se aos sem *uso na vida*. Entre os estudantes que fizeram *uso na vida* é maior a porcentagem dos que faltaram à escola, quando comparado aos sem uso de drogas (exceto tabaco e álcool). Nas classes sociais A e B houve maior porcentagem de *uso na vida*, quando se compara aos sem *uso na vida* para essas mesmas classes sociais (Tabela 2).
- III – Quanto aos tipos de uso – *uso na vida* até *uso pesado* – houve predomínio de uso para o sexo masculino, exceto quanto ao *uso pesado*. Embora a partir dos 16 anos se observam as maiores porcentagens de usuários, porém na faixa etária de 10 a 12 anos já é expressivo o número de *uso na vida*, com 12,7% do total de estudantes dessa faixa etária (Tabela 3).
- IV – As drogas mais utilizadas pelos estudantes, excetuando-se álcool e tabaco, pela ordem foram: solventes, maconha, ansiolíticos, anfetamínicos e anticolinérgicos. O *uso na vida* de energéticos foi feito por 12,0% dos estudantes. O total estimado de estudantes com *uso na vida* de drogas, da rede estadual de ensino do Brasil, foi de 22,6% – dados expandidos (Tabela 4).
- V – Na Tabela 5 podem-se notar várias diferenças estatisticamente significantes, quando se compara o *uso na vida* para as diferentes drogas entre os sexos. Assim, houve predomínio de *uso na vida* entre os homens para maconha, cocaína, solventes, anticolinérgicos, tabaco, crack, energéticos e esteróides anabolizantes. Nas mulheres o predomínio de *uso na vida* ocorreu para anfetamínicos, ansiolíticos e álcool.

Tabela 1: Características sociodemográficas de 48.155 estudantes das redes municipal e estadual do ensino fundamental e médio das 27 capitais brasileiras.

| Características | | n | % |
|------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Sexo | Masculino | 21141 | 43,9 |
| | Feminino | 24463 | 50,8 |
| | Não informado | 2551 | 5,3 |
| | Total | 48155 | 100,0 |
| Faixa etária (anos) | 10-12 | 13041 | 27,1 |
| | 13-15 | 17494 | 36,3 |
| | 16-18 | 9772 | 20,3 |
| | > 18 | 3628 | 7,5 |
| | Não informado | 4220 | 8,8 |
| Total | 48155 | 100,0 | |
| Grau escolar | Fundamental | 34482 | 71,6 |
| | Médio | 13673 | 28,4 |
| | Total | 48155 | 100,0 |
| Defasagem série/idade (anos) | Não tem | 21828 | 45,3 |
| | 1 a 2 | 14475 | 30,1 |
| | ≥ 3 | 7632 | 15,8 |
| | Não informado | 4220 | 8,8 |
| | Total | 48155 | 100,0 |
| Nível socio-econômico | A | 1380 | 2,9 |
| | B | 8798 | 18,3 |
| | C | 20036 | 41,6 |
| | D | 12158 | 25,2 |
| | E | 3854 | 8,0 |
| | Não informado | 1929 | 4,0 |
| Total | 48155 | 100,0 | |

Tabela 2: O uso na vida de drogas psicotrópicas, segundo características sociais de 48.155 estudantes das redes municipal e estadual das 27 capitais brasileiras, dados não expandidos.

| Características | | Uso na vida [‡] | | | |
|---|-------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------|
| | | Não | | Sim | |
| | | n | % | n | % |
| Defasagem série/idade (anos) | Não tem | 17966 | 48,1 | 3862 | 35,7* |
| | 1 a 2 | 10867 | 29,1 | 3608 | 33,3* |
| | ≥ 3 | 5344 | 14,3 | 2288 | 21,1* |
| | Não informado | 3150 | 8,4 | 1070 | 9,9 |
| Total | 37327 | 100,0 | 10828 | 100,0 | |
| Dias em que faltou à escola nos últimos 30 dias | Vim todos os dias | 21172 | 56,7 | 4581 | 42,3* |
| | 1 a 3 | 11291 | 30,2 | 3781 | 34,9* |
| | 4 a 8 | 2129 | 5,7 | 1171 | 10,8* |
| | ≥ 9 | 1270 | 3,4 | 856 | 7,9* |
| | Não informado | 1465 | 3,9 | 439 | 4,1 |
| Total | 37327 | 100,0 | 10828 | 100,0 | |
| Nível socio-econômico [°] | A | 932 | 2,5 | 448 | 4,1 |
| | B | 6542 | 17,5 | 2256 | 20,8** |
| | C | 15563 | 41,7 | 4473 | 41,3 |
| | D | 9630 | 25,8 | 2528 | 23,3 |
| | E | 3101 | 8,3 | 753 | 7,0** |
| | Não informado | 1559 | 4,2 | 370 | 3,4 |
| Total | 37327 | 100,0 | 10828 | 100,0 | |

[‡] Para definição de *uso na vida*, vide Metodologia.

* Diferença estatisticamente significativa entre *uso na vida*: não e sim. (Teste do χ^2 , $p < 0,05$).

[°] As chaves neste item indicam os agrupamentos feitos para a análise estatística.

** Diferença estatisticamente significativa entre não-usuários e usuários das classes A e B, das classes C, D e E (Teste do χ^2 , $p < 0,05$).

Tabela 3: Uso de drogas psicotrópicas em geral (exceto tabaco e álcool) entre 48.155 estudantes do ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual do Brasil; dados expressos em porcentagem, levando-se em conta os tipos de usos, conforme sexo e idade.

| Tipos de usos [◇] | Sexo% [‡] | | | Idade (anos)% [‡] | | | | |
|----------------------------|--------------------|-------|-----------------|----------------------------|-------|-------|------|-----------------|
| | M | F | NI [□] | 10-12 | 13-15 | 16-18 | > 18 | NI [□] |
| <i>Uso na vida</i> | 23,5 | 21,7* | 23,7 | 12,7 | 23,1 | 29,2 | 34,7 | 25,1 |
| <i>Uso no ano</i> | 20,4 | 18,8* | 20,6 | 10,2 | 20,3 | 26,5 | 29,2 | 21,3 |
| <i>Uso no mês</i> | 15,6 | 13,9* | 16,1 | 7,6 | 14,5 | 20,4 | 24,0 | 17,6 |
| <i>Uso freqüente</i> | 3,5 | 2,6* | 3,4 | 1,3 | 2,9 | 4,7 | 5,1 | 3,3 |
| <i>Uso pesado</i> | 2,3 | 1,7 | 2,3 | 0,9 | 1,9 | 3,0 | 3,6 | 2,2 |

[◇] Para definição de tipos de usos, vide Metodologia.

[‡] As porcentagens representam os dados expandidos (vide Metodologia); a diferença para 100% em cada tipo de uso representa não-usuários para o mesmo tipo de uso.

[□] NI significa dados não informados pelos alunos.

* Diferença estatisticamente significativa entre os dois sexos (Teste do χ^2 , $p < 0,05$).

Tabela 4: Uso de drogas psicotrópicas por 48.155 estudantes do ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual do Brasil; dados expressos em porcentagem, levando-se em conta os tipos de usos e as diferentes drogas individualmente.

| Drogas | Tipos de uso % [‡] | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|----------------|--------|-----------|------------|
| | Na vida | No ano | No mês | Frequente | Uso pesado |
| Maconha | 5,9 | 4,6 | 3,2 | 0,7 | 0,5 |
| Cocaína | 2,0 | 1,7 | 1,3 | 0,2 | 0,1 |
| Crack | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,1 | 0,1 |
| Anfetamínicos | 3,7 | 3,2 | 1,9 | 0,5 | 0,3 |
| Solventes | 15,5 | 14,1 | 9,8 | 1,5 | 0,9 |
| Ansiolíticos | 4,1 | 3,8 | 2,5 | 0,4 | 0,3 |
| Anticolinérgicos | 1,2 | 0,7 | 0,5 | 0,1 | 0,1 |
| Barbitúricos | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,1 | 0,1 |
| Opiáceos | 0,3 | – [†] | – | – | – |
| Xaropes | 0,4 | – | – | – | – |
| Alucinógenos | 0,6 | – | – | – | – |
| Orexígenos | 0,7 | – | – | – | – |
| Energéticos | 12,0 | – | – | – | – |
| Esteróides/Anabolizantes | 1,0 | – | – | – | – |
| Total tipos de uso• | 22,6 | 19,6 | 14,8 | 3,0 | 2,0 |
| Tabaco | 24,9 | 15,7 | 9,9 | 3,8 | 2,7 |
| Álcool | 65,2 | 63,3 | 44,3 | 11,7 | 6,7 |

[‡] As porcentagens representam os dados expandidos (vide Metodologia).

[†] O traço (–) indica dados não colhidos.

• Tipos de uso exclui tabaco e álcool. Vide definição de tipos de uso em Metodologia.

Tabela 5: *Uso na vida* de drogas psicotrópicas por 48.155 estudantes do ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual do Brasil; dados expressos em porcentagem, levando-se em conta sexo, idade e as diferentes drogas individualmente.

| Drogas | Sexo % [‡] | | | Idade (anos) % [‡] | | | | |
|--------------------------|---------------------|-------|-----------------|-----------------------------|-------|-------|------|-----------------|
| | M | F | NI [□] | 10-12 | 13-15 | 16-18 | > 18 | NI [□] |
| Maconha | 7,9 | 4,1* | 7,0 | 0,6 | 3,9 | 11,2 | 17,7 | 9,5 |
| Cocaína | 2,8 | 1,3* | 2,7 | 0,5 | 1,4 | 2,8 | 6,8 | 4,2 |
| Crack | 1,1 | 0,4 | 1,1 | 0,2 | 0,6 | 1,1 | 2,0 | 1,5 |
| Anfetamínicos | 3,0 | 4,3* | 3,5 | 1,7 | 3,9 | 4,8 | 4,7 | 4,9 |
| Solventes | 16,9 | 14,3* | 15,3 | 9,9 | 16,9 | 19,1 | 19,9 | 13,8 |
| Ansiolíticos | 3,1 | 5,0* | 4,4 | 1,5 | 4,1 | 5,8 | 7,0 | 6,3 |
| Anticolinérgicos | 1,3 | 1,0 | 1,3 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,8 | 1,3 |
| Barbitúricos | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,0 |
| Opiáceos | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,5 |
| Xaropes | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,6 |
| Alucinógenos | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,8 |
| Orexígenos | 0,4 | 1,0 | 0,7 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 1,1 |
| Energéticos | 14,9 | 9,4* | 12,4 | 4,3 | 12,8 | 18,9 | 20,0 | 11,0 |
| Esteróides/Anabolizantes | 1,7 | 0,2* | 1,8 | 0,3 | 0,6 | 2,0 | 2,4 | 1,5 |
| Total tipos de uso• | 23,5 | 21,7* | 23,7 | 12,6 | 23,2 | 29,6 | 34,9 | 25,8 |
| Tabaco | 25,2 | 24,7 | 25,3 | 7,0 | 24,7 | 39,7 | 41,3 | 34,6 |
| Álcool | 64,5 | 66,3* | 60,2 | 41,2 | 69,5 | 80,8 | 82,1 | 69,2 |

[‡] As porcentagens representam os dados expandidos (vide Metodologia).

[□] NI significa dados não informados pelos alunos.

• Para definição para tipos de uso, vide Metodologia.

* Diferença estatisticamente significante entre os dois sexos (Teste do χ^2 , $p < 0,05$).



Área: 3.852.968km²

1. População

| Capitais | Habitantes* |
|------------------|------------------|
| Belém – PA | 1.280.614 |
| Boa Vista – RR | 200.568 |
| Macapá – AP | 283.308 |
| Manaus – AM | 405.835 |
| Palmas – TO | 137.355 |
| Porto Velho – RO | 334.669 |
| Rio Branco – AC | 253.059 |
| Total | 2.895.408 |

*IBGE, censo 2000.

2. Estudantes

| Ensino | Estudantes matriculados* | | |
|---------------|--------------------------|------------------|----------------|
| | Escolas Públicas | Escolas Privadas | Total |
| Fundamental** | 337.338 | 41.561 | 378.899 |
| Médio | 252.519 | 34.729 | 287.248 |
| Total | 589.857 | 76.290 | 666.147 |

*INEP-ME, 2004.

**Alunos matriculados no Ensino Fundamental a partir da 5ª série.

REGIÃO NORTE

SINOPSE

- I – A amostra foi constituída de 10.030 estudantes, sendo a maioria do sexo feminino (50,9%). A faixa etária predominante foi a de 13 a 15 anos, com 36,2% dos pesquisados e 74,5% pertencentes ao ensino fundamental. A defasagem escolar atingiu 49,1% dos estudantes pesquisados. Somente 17,9% da amostra pertencia às classes sociais A ou B (Tabela 1).
- II – Observou-se maior defasagem escolar de 3 anos ou mais entre os que fizeram *uso na vida* (22,8%), ao comparar-se aos sem uso (15,4%). Entre os estudantes que fizeram *uso na vida* de drogas é maior a porcentagem dos que faltaram à escola (47,4%), quando comparado aos sem *uso na vida* de drogas – exceto tabaco e álcool (33,2%). Nas classes sociais A e B houve maior porcentagem de *uso na vida*, quando se compara aos sem uso para essas mesmas classes sociais (Tabela 2).
- III – Quanto aos tipos de uso – *uso na vida* até *uso pesado* – não houve predomínio entre ambos os sexos. Embora a partir dos 16 anos se observam as maiores porcentagens de estudantes que fizeram *uso na vida*, porém na faixa etária de 10 a 12 anos já é expressivo o número de estudantes com esse tipo de uso, sendo de 12,3% (Tabela 3).
- IV – As drogas mais utilizadas pelos estudantes, excetuando-se álcool e tabaco, pela ordem foram: solventes, maconha, anfetamínicos, ansiolíticos e cocaína com 2,9%. Os energéticos foram utilizados por 8,0% dos estudantes do país. O total estimado de estudantes com *uso na vida* de drogas, das redes municipal e estadual de ensino, na região Norte, foi de 21,6% – dados expandidos (Tabela 4).
- V – Na Tabela 5 podem-se notar várias diferenças estatisticamente significantes, quando se compara o *uso na vida* para as diferentes drogas entre os sexos. Assim, houve predomínio de *uso na vida* entre os homens para maconha, cocaína, tabaco, álcool, energéticos e esteróides anabolizantes. Nas mulheres o predomínio de *uso na vida* ocorreu para anfetamínicos e ansiolíticos.

Tabela 1: Características sociodemográficas de 10.030 estudantes das redes municipal e estadual do ensino fundamental e médio da região Norte do Brasil.

| Características | | n | % |
|------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Sexo | Masculino | 4369 | 43,6 |
| | Feminino | 5104 | 50,9 |
| | Não informado | 557 | 5,6 |
| | Total | 10030 | 100,0 |
| Faixa etária (anos) | 10-12 | 2757 | 27,5 |
| | 13-15 | 3627 | 36,2 |
| | 16-18 | 1942 | 19,4 |
| | > 18 | 795 | 7,9 |
| | Não informado | 909 | 9,1 |
| Total | 10030 | 100,0 | |
| Grau escolar | Fundamental | 7471 | 74,5 |
| | Médio | 2559 | 25,5 |
| | Total | 10030 | 100,0 |
| Defasagem série/idade (anos) | Não tem | 4191 | 41,8 |
| | 1 a 2 | 3224 | 32,1 |
| | ≥ 3 | 1706 | 17,0 |
| | Não informado | 909 | 9,1 |
| | Total | 10030 | 100,0 |
| Nível socio-econômico | A | 235 | 2,3 |
| | B | 1564 | 15,6 |
| | C | 4186 | 41,7 |
| | D | 2648 | 26,4 |
| | E | 930 | 9,3 |
| | Não informado | 467 | 4,7 |
| Total | 10030 | 100,0 | |

Tabela 2: O uso na vida de drogas psicotrópicas, segundo características sociais de 10.030 estudantes das redes municipal e estadual da região Norte[†] do Brasil, dados não expandidos.

| Características | | Uso na vida [‡] | | | |
|---|-------------------|--------------------------|-------------|--------------|--------|
| | | Não | | Sim | |
| | | n | % | n | % |
| Defasagem série/idade (anos) | Não tem | 3453 | 43,9 | 738 | 34,2* |
| | 1 a 2 | 2526 | 32,1 | 698 | 32,3 |
| | ≥ 3 | 1213 | 15,4 | 493 | 22,8* |
| | Não informado | 680 | 8,6 | 229 | 10,6 |
| Total | 7872 | 100,0 | 2158 | 100,0 | |
| Dias em que faltou à escola nos últimos 30 dias | Vim todos os dias | 4945 | 62,8 | 1042 | 48,3* |
| | 1 a 3 | 2041 | 25,9 | 696 | 32,3* |
| | 4 a 8 | 360 | 4,6 | 192 | 8,9* |
| | ≥ 9 | 215 | 2,7 | 133 | 6,2* |
| | Não informado | 311 | 4,0 | 95 | 4,4 |
| Total | 7872 | 100,0 | 2158 | 100,0 | |
| Nível socio-econômico [°] | A | 167 | 2,1 | 68 | 3,2 |
| | B | 1170 | 14,9 | 394 | 18,3** |
| | C | 3283 | 41,7 | 903 | 41,8 |
| | D | 2121 | 26,9 | 527 | 24,4 |
| | E | 750 | 9,5 | 180 | 8,3 |
| | Não informado | 381 | 4,8 | 86 | 4,0 |
| Total | 7872 | 100,0 | 2158 | 100,0 | |

[†] Belém-PA, Boa Vista-RR, Macapá-AP, Manaus-AM, Palmas-TO, Porto Velho-RO, Rio Branco-AC.

[‡] Para definição de *uso na vida*, vide Metodologia.

* Diferença estatisticamente significativa entre *uso na vida*: não e sim. (Teste do χ^2 , $p < 0,05$).

[°] As chaves neste item indicam os agrupamentos feitos para a análise estatística.

** Diferença estatisticamente significativa entre não-usuários e usuários das classes A e B, das classes C, D e E (Teste do χ^2 , $p < 0,05$).

Tabela 3: Uso de drogas psicotrópicas em geral (exceto tabaco e álcool) entre 10.030 estudantes do ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual da região Norte; dados expressos em porcentagem, levando-se em conta os tipos de usos, conforme sexo e idade.

| Tipos de usos [◇] | Sexo% [‡] | | | Idade (anos)% [‡] | | | | |
|----------------------------|--------------------|-------|-----------------|----------------------------|-------|-------|------|-----------------|
| | M | F | NI [□] | 10-12 | 13-15 | 16-18 | > 18 | NI [□] |
| <i>Uso na vida</i> | 22,4 | 21,1* | 20,5 | 12,3 | 23,4 | 25,8 | 33,2 | 25,3 |
| <i>Uso no ano</i> | 18,7 | 17,9 | 17,2 | 10,0 | 20,0 | 23,2 | 27,1 | 20,4 |
| <i>Uso no mês</i> | 14,7 | 13,3* | 13,0 | 7,4 | 14,2 | 18,5 | 23,3 | 17,3 |
| <i>Uso freqüente</i> | 2,9 | 2,1 | 2,0 | 0,9 | 2,3 | 3,6 | 4,0 | 3,0 |
| <i>Uso pesado</i> | 1,8 | 1,5 | 0,9 | 0,5 | 1,6 | 2,3 | 2,8 | 1,8 |

[◇] Para definição de tipos de usos, vide Metodologia.

[‡] As porcentagens representam os dados expandidos (vide Metodologia); a diferença para 100% em cada tipo de uso representa não-usuários para o mesmo tipo de uso.

[□] NI significa dados não informados pelos alunos.

* Diferença estatisticamente significativa entre os dois sexos (Teste do χ^2 , $p < 0,05$).

Tabela 4: Uso de drogas psicotrópicas por 10.030 estudantes do ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual da região Norte; dados expressos em porcentagem, levando-se em conta os tipos de usos e as diferentes drogas individualmente.

| Drogas | Tipos de uso % [‡] | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|------------------|-------------------|
| | <i>Na vida</i> | <i>No ano</i> | <i>No mês</i> | <i>Freqüente</i> | <i>Uso pesado</i> |
| Maconha | 5,7 | 4,4 | 3,0 | 0,6 | 0,4 |
| Cocaína | 2,9 | 2,4 | 1,9 | 0,3 | 0,2 |
| Crack | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,0 |
| Anfetamínicos | 3,4 | 2,9 | 1,7 | 0,4 | 0,3 |
| Solventes | 14,4 | 12,9 | 9,4 | 1,2 | 0,7 |
| Ansiolíticos | 2,9 | 2,5 | 1,7 | 0,2 | 0,1 |
| Anticolinérgicos | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| Barbitúricos | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Opiáceos | 0,3 | – [†] | – | – | – |
| Xaropes | 0,3 | – | – | – | – |
| Alucinógenos | 0,4 | – | – | – | – |
| Orexígenos | 0,6 | – | – | – | – |
| Energéticos | 8,0 | – | – | – | – |
| Esteróides/Anabolizantes | 1,2 | – | – | – | – |
| Total tipos de uso• | 21,6 | 18,2 | 13,9 | 2,4 | 1,6 |
| Tabaco | 26,1 | 16,9 | 10,7 | 3,7 | 2,5 |
| Álcool | 58,2 | 56,1 | 39,1 | 8,4 | 5,0 |

[‡] As porcentagens representam os dados expandidos (vide Metodologia).

[†] O traço (–) indica dados não colhidos.

• Tipos de uso exclui tabaco e álcool. Vide definição de tipos de uso em Metodologia.

Tabela 5: *Uso na vida* de drogas psicotrópicas por 10.030 estudantes do ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual da região Norte; dados expressos em porcentagem, levando-se em conta sexo, idade e as diferentes drogas individualmente.

| Drogas | Sexo % [‡] | | | Idade (anos) % [‡] | | | | |
|--------------------------|---------------------|-------|-----------------|-----------------------------|-------|-------|------|-----------------|
| | M | F | NI [□] | 10-12 | 13-15 | 16-18 | > 18 | NI [□] |
| Maconha | 8,1 | 3,7* | 5,9 | 0,4 | 3,2 | 10,3 | 18,3 | 11,4 |
| Cocaína | 4,2 | 1,8* | 3,1 | 0,4 | 1,6 | 3,9 | 10,1 | 6,4 |
| Crack | 0,9 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,9 | 2,0 | 1,0 |
| Anfetamínicos | 2,9 | 3,9* | 2,8 | 1,5 | 3,6 | 4,1 | 3,7 | 4,8 |
| Solventes | 14,9 | 14,3 | 11,2 | 10,2 | 17,4 | 16,0 | 17,5 | 12,2 |
| Ansiolíticos | 2,3 | 3,4* | 3,2 | 1,1 | 3,1 | 3,9 | 4,0 | 4,9 |
| Anticolinérgicos | 0,9 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 0,6 | 1,2 | 1,5 |
| Barbitúricos | 0,5 | 0,7 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 0,6 |
| Opiáceos | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,6 |
| Xaropes | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
| Alucinógenos | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 0,7 |
| Orexígenos | 0,3 | 0,8 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 1,2 | 0,9 |
| Energéticos | 10,6 | 5,7* | 7,6 | 2,7 | 8,0 | 12,8 | 14,0 | 7,3 |
| Esteróides/Anabolizantes | 2,0 | 0,5* | 2,0 | 0,2 | 0,6 | 2,0 | 3,5 | 2,0 |
| Total tipos de uso• | 22,4 | 21,1* | 20,5 | 12,8 | 23,5 | 25,2 | 33,9 | 24,9 |
| Tabaco | 28,5 | 24,3* | 25,1 | 6,4 | 24,8 | 41,5 | 45,8 | 38,0 |
| Álcool | 59,1 | 58,3* | 50,7 | 31,2 | 61,7 | 76,1 | 79,8 | 65,8 |

[‡] As porcentagens representam os dados expandidos (vide Metodologia).

[□] NI significa dados não informados pelos alunos.

• Para definição para tipos de uso, vide Metodologia.

* Diferença estatisticamente significante entre os dois sexos (Teste do χ^2 , $p < 0,05$).



1. População

| | |
|---------------------------|--|
| • População geral | 1.280.614 habitantes ^(IBGE, 2004) |
| • População de 10-19 anos | 271.933 habitantes ^(IBGE, 2004) |

2. Estudantes

| Estudantes matriculados em 2004* | | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Ensino | Escola Pública | Escola Privada | Total |
| Fundamental** | 81.086 | 14.736 | 95.822 |
| Médio | 80.455 | 16.526 | 96.981 |
| Total | 161.541 | 31.262 | 192.803 |

*INEP-ME, 2004.

**Alunos matriculados no Ensino Fundamental a partir da 5ª série.

3. Amostra

| | Escolas Públicas* | Escolas Sorteadas | Turmas Sorteadas |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Municipais | 34 | 03 | 12 |
| Estaduais | 125 | 13 | 50 |
| Federais | 03 | 0 | 0 |
| Total | 162 | 16 | 62 |

*INEP-ME, 2003.

| Questionários | Aplicados | 1.561 |
|---------------|----------------|--------------|
| | Em branco | 0 |
| | Excluídos | 03 |
| | Válidos | 1.558 |

Belém-PA

Equipe

supervisão

José Maria de Souza

coordenação

Fernanda Therezinha de Jesus Martins de Souza

entrevistadores

Jairo Augusto A. de Castro

Maria Tereza Souza

Márcia Smith Mesquita

SINOPSE

- I – A amostra constituiu-se de 1.558 estudantes, com maior representação do sexo feminino e predomínio de porcentagem entre as diferentes faixas etárias de 13 a 15 anos. Ressalte-se que 55,3% da amostra apresentou defasagem escolar e apenas 11,8% foi classificada nos níveis socioeconômicos A ou B (Tabela 1).
- II – Um número significativamente maior de alunos que fizeram *uso na vida* tem defasagem escolar de 3 ou mais anos, comparados aos sem uso, para o mesmo critério. Da mesma forma, aqueles com *uso na vida* faltaram mais à escola nos últimos 30 dias que antecederam a pesquisa que os sem uso de drogas – exceto tabaco e álcool. Em relação ao nível socioeconômico, não houve diferenças estatísticas entre a presença ou não de *uso na vida* (Tabela 2).
- III – Na amostra de Belém houve maior porcentagem de estudantes do sexo masculino que fizeram *uso freqüente* de drogas. O *uso na vida* de drogas já foi detectado na faixa etária entre 10 e 12 anos (8,2%) (Tabela 3).
- IV – Excetuando-se álcool e tabaco, as drogas mais freqüentemente usadas pela ordem foram: solventes, maconha, anfetamínicos e cocaína. Há um total estimado de 19,2% de estudantes, das redes municipal e estadual de ensino de Belém, que fizeram *uso na vida* de drogas. A porcentagem de *uso na vida* de energizantes foi expressiva, com 6,9% do total de estudantes já tendo feito uso dessas substâncias – dados expandidos (Tabela 4).
- V – Entre os homens houve predomínio estatisticamente significativa para *uso na vida* de maconha, cocaína, crack, anfetamínicos e energizantes quando comparados às mulheres. Conforme a idade avança, maiores são as porcentagens de *uso na vida* de drogas (Tabela 5).

Tabela 1: Características sociodemográficas de 1.558 estudantes das redes municipal e estadual de Belém.

| Características | | n | % |
|------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Sexo | Masculino | 672 | 43,1 |
| | Feminino | 830 | 53,3 |
| | Não informado | 56 | 3,6 |
| | Total | 1558 | 100,0 |
| Faixa etária (anos) | 10-12 | 441 | 28,3 |
| | 13-15 | 663 | 42,6 |
| | 16-18 | 234 | 15,0 |
| | > 18 | 99 | 6,4 |
| | Não informado | 121 | 7,8 |
| | Total | 1558 | 100,0 |
| Grau escolar | Fundamental | 1271 | 81,6 |
| | Médio | 287 | 18,4 |
| | Total | 1558 | 100,0 |
| Defasagem série/idade (anos) | Não tem | 575 | 36,9 |
| | 1 a 2 | 550 | 35,3 |
| | ≥ 3 | 312 | 20,0 |
| | Não informado | 121 | 7,8 |
| | Total | 1558 | 100,0 |
| Nível socio-econômico | A | 26 | 1,7 |
| | B | 157 | 10,1 |
| | C | 675 | 43,3 |
| | D | 455 | 29,2 |
| | E | 165 | 10,6 |
| | Não informado | 80 | 5,1 |
| Total | 1558 | 100,0 | |

Tabela 2: O uso na vida de drogas psicotrópicas, segundo características sociais de 1.558 estudantes das redes municipal e estadual de Belém, dados não expandidos.

| Características | | Uso na vida [‡] | | | |
|---|-------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Não | | Sim | |
| | | n | % | n | % |
| Defasagem série/idade (anos) | Não tem | 496 | 39,2 | 79 | 26,9* |
| | 1 a 2 | 440 | 34,8 | 110 | 37,4 |
| | ≥ 3 | 237 | 18,8 | 75 | 25,5* |
| | Não informado | 91 | 7,2 | 30 | 10,2 |
| | Total | 1264 | 100,0 | 294 | 100,0 |
| Dias em que faltou à escola nos últimos 30 dias | Vim todos os dias | 830 | 65,7 | 144 | 49,0* |
| | 1 a 3 | 290 | 22,9 | 97 | 33,0* |
| | 4 a 8 | 57 | 4,5 | 24 | 8,2* |
| | ≥ 9 | 44 | 3,5 | 15 | 5,1* |
| | Não informado | 43 | 3,4 | 14 | 4,8 |
| Total | 1264 | 100,0 | 294 | 100,0 | |
| Nível socio-econômico [°] | A | 18 | 1,4 | 8 | 2,7 |
| | B | 123 | 9,7 | 34 | 11,6 |
| | C | 543 | 43,0 | 132 | 44,9 |
| | D | 376 | 29,7 | 79 | 26,9 |
| | E | 140 | 11,1 | 25 | 8,5 |
| | Não informado | 64 | 5,1 | 16 | 5,4 |
| Total | 1264 | 100,0 | 294 | 100,0 | |

[‡] Para definição de *uso na vida*, vide Metodologia.

* Diferença estatisticamente significativa entre *uso na vida*: não e sim. (Teste do χ^2 , $p < 0,05$).

[°] As chaves neste item indicam os agrupamentos feitos para a análise estatística.

Tabela 3: Uso de drogas psicotrópicas em geral (exceto tabaco e álcool) entre 1.558 estudantes do ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual de Belém; dados expressos em porcentagem, levando-se em conta os tipos de usos, conforme sexo e idade.

| Tipos de usos [◇] | Sexo [‡] | | | Idade (anos) [‡] | | | | |
|----------------------------|-------------------|------|-----------------|---------------------------|-------|-------|------|-----------------|
| | M | F | NI [□] | 10-12 | 13-15 | 16-18 | > 18 | NI [□] |
| <i>Uso na vida</i> | 20,6 | 18,0 | 22,0 | 8,2 | 22,7 | 22,0 | 23,0 | 19,9 |
| <i>Uso no ano</i> | 17,7 | 15,1 | 19,6 | 6,4 | 19,5 | 18,9 | 21,6 | 16,3 |
| <i>Uso no mês</i> | 14,1 | 11,3 | 20,9 | 4,4 | 14,9 | 15,2 | 20,2 | 15,0 |
| <i>Uso freqüente</i> | 3,0 | 1,7 | 2,4 | 0,6 | 2,1 | 3,9 | 2,8 | 3,0 |
| <i>Uso pesado</i> | 1,4 | 1,2 | 0,0 | 0,5 | 1,1 | 1,5 | 2,3 | 1,7 |

[◇] Para definição de tipos de usos, vide Metodologia.

[‡] As porcentagens representam os dados expandidos (vide Metodologia); a diferença para 100% em cada tipo de uso representa não-usuários para o mesmo tipo de uso.

[□] NI significa dados não informados pelos alunos.

Tabela 4: Uso de drogas psicotrópicas por 1.558 estudantes do ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual de Belém; dados expressos em porcentagem, levando-se em conta os tipos de usos e as diferentes drogas individualmente.

| Drogas | Tipos de uso % [‡] | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|------------------|-------------------|
| | <i>Na vida</i> | <i>No ano</i> | <i>No mês</i> | <i>Frequente</i> | <i>Uso pesado</i> |
| Maconha | 4,1 | 3,2 | 2,5 | 0,7 | 0,4 |
| Cocaína | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 0,5 | 0,2 |
| Crack | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,0 |
| Anfetamínicos | 2,9 | 2,5 | 1,4 | 0,3 | 0,2 |
| Solventes | 13,5 | 12,2 | 9,3 | 1,1 | 0,6 |
| Ansiolíticos | 1,9 | 1,6 | 1,3 | 0,3 | 0,1 |
| Anticolinérgicos | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,1 |
| Barbitúricos | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Opiáceos | 0,4 | – [†] | – | – | – |
| Xaropes | 0,3 | – | – | – | – |
| Alucinógenos | 0,5 | – | – | – | – |
| Orexígenos | 0,6 | – | – | – | – |
| Energéticos | 6,9 | – | – | – | – |
| Esteróides/Anabolizantes | 0,7 | – | – | – | – |
| Total tipos de uso• | 19,2 | 16,4 | 12,8 | 2,2 | 1,2 |
| Tabaco | 23,7 | 16,1 | 10,5 | 3,5 | 2,2 |
| Álcool | 57,5 | 55,0 | 40,6 | 9,3 | 5,7 |

[‡] As porcentagens representam os dados expandidos (vide Metodologia).

[†] O traço (–) indica dados não colhidos.

• Tipos de uso exclui tabaco e álcool. Vide definição de tipos de uso em Metodologia.

Tabela 5: *Uso na vida* de drogas psicotrópicas por 1.558 estudantes do ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual de Belém; dados expressos em porcentagem, levando-se em conta sexo, idade e as diferentes drogas individualmente.

| Drogas | Sexo % [‡] | | | Idade (anos) % [‡] | | | | |
|--------------------------|---------------------|-------|-----------------|-----------------------------|-------|-------|------|-----------------|
| | M | F | NI [□] | 10-12 | 13-15 | 16-18 | > 18 | NI [□] |
| Maconha | 6,4 | 2,5* | 2,3 | 0,0 | 2,7 | 3,9 | 10,8 | 8,3 |
| Cocaína | 3,3 | 1,2* | 2,3 | 0,2 | 0,8 | 2,8 | 4,4 | 4,9 |
| Crack | 1,3 | 0,2* | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 1,1 | 0,7 | 1,7 |
| Anfetamínicos | 3,1 | 2,4 | 7,0 | 0,8 | 3,2 | 3,1 | 2,3 | 5,6 |
| Solventes | 15,0 | 12,7* | 9,2 | 6,9 | 17,8 | 13,1 | 17,4 | 9,9 |
| Ansiolíticos | 1,5 | 1,9 | 5,8 | 0,1 | 2,3 | 2,6 | 1,8 | 4,1 |
| Anticolinérgicos | 1,1 | 0,8 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 1,8 | 1,7 |
| Barbitúricos | 0,6 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,9 | 0,9 | 1,1 |
| Opiáceos | 0,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 1,3 | 0,7 |
| Xaropes | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1,1 |
| Alucinógenos | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 1,3 | 1,3 |
| Orexígenos | 0,3 | 0,9 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 1,1 | 1,3 |
| Energéticos | 10,1 | 4,0* | 10,1 | 1,9 | 6,7 | 12,5 | 5,0 | 11,2 |
| Esteróides/Anabolizantes | 1,4 | 0,1* | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 3,0 | 0,8 |
| Total tipos de uso• | 20,6 | 18,0 | 22,0 | 8,2 | 22,7 | 22,0 | 23,0 | 19,9 |
| Tabaco | 26,7 | 21,7 | 24,0 | 3,1 | 27,4 | 34,2 | 30,1 | 35,8 |
| Álcool | 58,6 | 57,5 | 46,6 | 27,2 | 63,9 | 74,7 | 54,7 | 56,3 |

[‡] As porcentagens representam os dados expandidos (vide Metodologia).

[□] NI significa dados não informados pelos alunos.

• Para definição para tipos de uso, vide Metodologia.

* Diferença estatisticamente significante entre os dois sexos (Teste do χ^2 , $p < 0,05$).



1. População

| | |
|---------------------------|--|
| • População geral | 200.568 habitantes ^(IBGE, 2004) |
| • População de 10-19 anos | 45.480 habitantes ^(IBGE, 2004) |

2. Estudantes

| Estudantes matriculados em 2004* | | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Ensino | Escola Pública | Escola Privada | Total |
| Fundamental** | 18.549 | 1.212 | 19.761 |
| Médio | 10.931 | 769 | 11.700 |
| Total | 29.480 | 1.981 | 31.461 |

*INEP-ME, 2004.

**Alunos matriculados no Ensino Fundamental a partir da 5ª série.

3. Amostra

| | Escolas Públicas* | Escolas Sorteadas | Turmas Sorteadas |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Municipais | 02 | 01 | 04 |
| Estaduais | 57 | 11 | 62 |
| Federais | 01 | 0 | 0 |
| Total | 60 | 12 | 66 |

*INEP-ME, 2003.

| Questionários | Aplicados | 1.514 |
|---------------|----------------|--------------|
| | Em branco | 166 |
| | Excluídos | 07 |
| | Válidos | 1.341 |

Boa Vista–RR

Equipe

supervisão e coordenação

Elisângela Silva da Costa

entrevistadora

Perla Jordana Monteiro de Lima

SINOPSE

- I – A amostra constituiu-se de 1.341 estudantes com maior representação do sexo feminino e semelhança de porcentagens entre as faixas etárias de 10 a 12 e 13 a 15 anos. Ressalte-se que 37,1% da amostra apresentou defasagem escolar e apenas 20,8% foram classificados nos níveis socioeconômicos A ou B (Tabela 1).
- II – Um número significativamente maior de estudantes com *uso na vida* tem defasagem escolar, quando comparados aos sem *uso na vida* para o mesmo critério. Da mesma forma, os estudantes que já fizeram *uso na vida* faltaram mais à escola nos últimos 30 dias que antecederam a pesquisa que os sem *uso na vida* – exceto tabaco e álcool. Em relação ao nível socioeconômico, não houve diferenças estatísticas entre aqueles com ou sem *uso na vida* (Tabela 2).
- III – Na amostra de Boa Vista houve maior porcentagem de estudantes do sexo masculino que fizeram *uso na vida*, *freqüente* e *pesado* de drogas, sendo o *uso na vida* já detectado na faixa etária entre 10 e 12 anos, com 17,2% dos entrevistados dessa faixa etária. O *uso pesado* de drogas foi relatado por 2,9%, excluindo-se da análise o álcool e o tabaco (Tabela 3).
- IV – Excetuando-se álcool e tabaco, as drogas mais freqüentemente usadas, pela ordem, foram: solventes, maconha, anfetamínicos, cocaína e ansiolíticos. O uso de energéticos apareceu em 15,1% do total de alunos. Há um total estimado de 12,3% de estudantes, das redes municipal e estadual de ensino de Boa Vista, que fizeram *uso na vida* de drogas psicotrópicas – dados expandidos (Tabela 4).
- V – Entre as mulheres houve predomínio do uso de anfetamínicos e ansiolíticos, porém sem diferir estatisticamente. Entre os homens houve predomínio estatisticamente significativa para *uso na vida* de maconha, cocaína, crack, solventes e energéticos quando comparados às mulheres. Os solventes já foram usados por 13,9% dos estudantes da faixa etária de 10 a 12 anos (Tabela 5).

Tabela 1: Características sociodemográficas de 1.341 estudantes das redes municipal e estadual de Boa Vista.

| Características | | n | % |
|------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Sexo | Masculino | 635 | 47,4 |
| | Feminino | 699 | 52,1 |
| | Não informado | 7 | 0,5 |
| | Total | 1341 | 100,0 |
| Faixa etária (anos) | 10-12 | 410 | 30,3 |
| | 13-15 | 460 | 34,3 |
| | 16-18 | 199 | 14,8 |
| | > 18 | 129 | 9,6 |
| | Não informado | 143 | 10,7 |
| Total | 1341 | 100,0 | |
| Grau escolar | Fundamental | 1025 | 76,4 |
| | Médio | 316 | 23,6 |
| | Total | 1341 | 100,0 |
| Defasagem série/idade (anos) | Não tem | 700 | 52,2 |
| | 1 a 2 | 311 | 23,2 |
| | ≥ 3 | 187 | 13,9 |
| | Não informado | 143 | 10,7 |
| Total | 1341 | 100,0 | |
| Nível socio-econômico | A | 34 | 2,5 |
| | B | 245 | 18,3 |
| | C | 552 | 41,2 |
| | D | 310 | 23,1 |
| | E | 149 | 11,1 |
| | Não informado | 51 | 3,8 |
| Total | 1341 | 100,0 | |

Tabela 2: O uso na vida de drogas psicotrópicas, segundo características sociais de 1.341 estudantes das redes municipal e estadual de Boa Vista, dados não expandidos.

| Características | | Uso na vida [‡] | | | |
|---|-------------------|--------------------------|------------|--------------|-------|
| | | Não | | Sim | |
| | | n | % | n | % |
| Defasagem série/idade (anos) | Não tem | 550 | 56,1 | 150 | 41,7* |
| | 1 a 2 | 211 | 21,5 | 100 | 27,8* |
| | ≥ 3 | 123 | 12,5 | 64 | 17,8* |
| | Não informado | 97 | 9,9 | 46 | 12,8 |
| Total | 981 | 100,0 | 360 | 100,0 | |
| Dias em que faltou à escola nos últimos 30 dias | Vim todos os dias | 551 | 56,2 | 146 | 40,6* |
| | 1 a 3 | 318 | 32,4 | 128 | 35,6 |
| | 4 a 8 | 50 | 5,1 | 43 | 11,9* |
| | ≥ 9 | 20 | 2,0 | 25 | 6,9* |
| Não informado | 42 | 4,3 | 18 | 5,0 | |
| Total | 981 | 100,0 | 360 | 100,0 | |
| Nível socio-econômico [°] | A | 23 | 2,3 | 11 | 3,1 |
| | B | 176 | 17,9 | 69 | 19,2 |
| | C | 399 | 40,7 | 153 | 42,5 |
| | D | 232 | 23,6 | 78 | 21,7 |
| | E | 111 | 11,3 | 38 | 10,6 |
| | Não informado | 40 | 4,1 | 11 | 3,1 |
| Total | 981 | 100,0 | 360 | 100,0 | |

[‡] Para definição de *uso na vida*, vide Metodologia.

* Diferença estatisticamente significativa entre *uso na vida*: não e sim. (Teste do χ^2 , $p < 0,05$).

[°] As chaves neste item indicam os agrupamentos feitos para a análise estatística.

Tabela 3: Uso de drogas psicotrópicas em geral (exceto tabaco e álcool) entre 1.341 estudantes do ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual de Boa Vista; dados expressos em porcentagem, levando-se em conta os tipos de usos, conforme sexo e idade.

| Tipos de usos [◇] | Sexo% [‡] | | | Idade (anos)% [‡] | | | | |
|----------------------------|--------------------|------|-----------------|----------------------------|-------|-------|------|-----------------|
| | M | F | NI [□] | 10-12 | 13-15 | 16-18 | > 18 | NI [□] |
| <i>Uso na vida</i> | 28,9 | 25,6 | 8,3 | 17,2 | 30,8 | 32,3 | 35,4 | 33,0 |
| <i>Uso no ano</i> | 23,3 | 22,5 | 8,3 | 14,5 | 25,1 | 31,8 | 33,8 | 26,6 |
| <i>Uso no mês</i> | 18,1 | 16,6 | 8,3 | 10,1 | 17,3 | 23,1 | 28,4 | 23,2 |
| <i>Uso freqüente</i> | 4,9 | 2,6 | 0,0 | 1,6 | 3,9 | 3,1 | 5,6 | 4,3 |
| <i>Uso pesado</i> | 2,9 | 1,7 | 0,0 | 0,5 | 2,2 | 2,8 | 2,8 | 3,0 |

[◇] Para definição de tipos de usos, vide Metodologia.

[‡] As porcentagens representam os dados expandidos (vide Metodologia); a diferença para 100% em cada tipo de uso representa não-usuários para o mesmo tipo de uso.

[□] NI significa dados não informados pelos alunos.

Tabela 4: Uso de drogas psicotrópicas por 1.341 estudantes do ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual de Boa Vista; dados expressos em porcentagem, levando-se em conta as categorias e as diferentes drogas individualmente.

| Drogas | Tipos de uso % [‡] | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|------------------|-------------------|
| | <i>Na vida</i> | <i>No ano</i> | <i>No mês</i> | <i>Freqüente</i> | <i>Uso pesado</i> |
| Maconha | 8,5 | 6,5 | 4,5 | 1,1 | 0,7 |
| Cocaína | 4,9 | 3,4 | 2,8 | 0,7 | 0,3 |
| Crack | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 0,2 | 0,2 |
| Anfetamínicos | 5,5 | 5,0 | 3,1 | 0,6 | 0,5 |
| Solventes | 18,7 | 16,7 | 11,7 | 1,8 | 1,0 |
| Ansiolíticos | 4,1 | 3,1 | 2,6 | 0,2 | 0,1 |
| Anticolinérgicos | 1,9 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 0,1 |
| Barbitúricos | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,1 |
| Opiáceos | 0,4 | – [†] | – | – | – |
| Xaropes | 0,8 | – | – | – | – |
| Alucinógenos | 0,8 | – | – | – | – |
| Orexígenos | 0,5 | – | – | – | – |
| Energéticos | 9,5 | – | – | – | – |
| Esteróides/Anabolizantes | 2,2 | – | – | – | – |
| Total tipos de uso• | 27,3 | 22,9 | 17,4 | 3,7 | 2,3 |
| Tabaco | 29,5 | 19,6 | 13,4 | 5,0 | 3,6 |
| Álcool | 62,9 | 60,4 | 41,1 | 10,6 | 6,5 |

[‡] As porcentagens representam os dados expandidos (vide Metodologia).

[†] O traço (–) indica dados não colhidos.

• Tipos de uso exclui tabaco e álcool. Vide definição de tipos de uso em Metodologia.

Tabela 5: *Uso na vida* de drogas psicotrópicas por 1.341 estudantes do ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual de Boa Vista; dados expressos em porcentagem, levando-se em conta sexo, idade e as diferentes drogas individualmente.

| Drogas | Sexo % [‡] | | | Idade (anos) % [‡] | | | | |
|--------------------------|---------------------|-------|-----------------|-----------------------------|-------|-------|------|-----------------|
| | M | F | NI [□] | 10-12 | 13-15 | 16-18 | > 18 | NI [□] |
| Maconha | 12,1 | 5,2* | 0,0 | 0,4 | 5,3 | 15,1 | 21,5 | 17,0 |
| Cocaína | 6,8 | 3,3* | 0,0 | 1,1 | 4,4 | 4,9 | 12,0 | 7,5 |
| Crack | 2,1 | 0,3* | 0,0 | 0,1 | 1,1 | 0,9 | 4,5 | 0,4 |
| Anfetamínicos | 3,7 | 7,0* | 8,3 | 2,6 | 6,5 | 4,5 | 4,6 | 12,3 |
| Solventes | 21,3 | 16,5* | 0,0 | 13,9 | 24,2 | 25,8 | 18,6 | 10,1 |
| Ansiolíticos | 3,1 | 4,8* | 8,3 | 2,0 | 4,2 | 1,9 | 4,1 | 10,8 |
| Anticolinérgicos | 2,7 | 1,3 | 0,0 | 1,5 | 2,6 | 1,0 | 0,5 | 2,2 |
| Barbitúricos | 0,9 | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 1,9 |
| Opiáceos | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,5 | 0,6 |
| Xaropes | 1,0 | 0,6 | 0,0 | 1,4 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Alucinógenos | 1,1 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,3 | 3,5 | 0,5 | 0,6 |
| Orexígenos | 0,8 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 1,2 | 0,9 | 0,0 |
| Energéticos | 12,5 | 6,9* | 0,0 | 4,1 | 10,6 | 12,9 | 20,3 | 3,1 |
| Esteróides/Anabolizantes | 3,5 | 1,2 | 0,0 | 0,2 | 2,5 | 4,7 | 5,5 | 2,0 |
| Total tipos de uso• | 28,9 | 25,6 | 8,3 | 19,7 | 35,6 | 33,4 | 38,0 | 33,7 |
| Tabaco | 31,0 | 28,0 | 8,3 | 9,6 | 30,9 | 47,8 | 47,0 | 55,0 |
| Álcool | 62,1 | 63,4 | 33,3 | 36,5 | 71,4 | 78,9 | 78,3 | 80,3 |

[‡] As porcentagens representam os dados expandidos (vide Metodologia).

[□] NI significa dados não informados pelos alunos.

• Para definição para tipos de uso, vide Metodologia.

* Diferença estatisticamente significativa entre os dois sexos (Teste do χ^2 , $p < 0,05$).



1. População

| | |
|---------------------------|--|
| • População geral | 283.308 habitantes ^(IBGE, 2004) |
| • População de 10-19 anos | 64.564 habitantes ^(IBGE, 2004) |

2. Estudantes

| Estudantes matriculados em 2004* | | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Ensino | Escola Pública | Escola Privada | Total |
| Fundamental** | 29.025 | 2.371 | 31.396 |
| Médio | 18.439 | 2.166 | 20.605 |
| Total | 47.464 | 4.537 | 52.001 |

*INEP-ME, 2004.

**Alunos matriculados no Ensino Fundamental a partir da 5ª série.

3. Amostra

| | Escolas Públicas* | Escolas Sorteadas | Turmas Sorteadas |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Municipais | 07 | 01 | 4 |
| Estaduais | 50 | 08 | 17 |
| Federais | 0 | 0 | 0 |
| Total | 57 | 09 | 21 |

*INEP-ME, 2003.

| Questionários | Aplicados | 610 |
|---------------|----------------|------------|
| | Em branco | 0 |
| | Excluídos | 0 |
| | Válidos | 610 |

Macapá-AP

Equipe

supervisão

Michele Maleamá Sfair da Cruz

coordenação

Elisena Uchoa Medeiros

entrevistadores

Breno Correa de Oliveira

Enilton Barbosa de Souza

Lucilene Brasil Sarmiento

Maria Benedita Gomes da Costa

Paulo Sergio Trindade Roman

SINOPSE

- I – A amostra constou de 610 estudantes, sendo maior a porcentagem do sexo feminino (52,1%). A maior parte da amostra se encontrava na faixa etária de 10 a 12 anos (45,9%), sendo que 79,7% dos estudantes cursavam o ensino fundamental. No Macapá, 34,9% dos estudantes apresentaram defasagem escolar e 25,7% pertenciam às classes sociais A ou B (Tabela 1).
- II – É maior a porcentagem de alunos com *uso na vida* (13,4%) que apresentaram defasagem escolar de 3 anos ou mais, em comparação aos sem *uso na vida* (6,7%). Da mesma forma, é maior o número de alunos com *uso na vida* que faltaram à escola nos últimos 30 dias, quando comparado aos sem uso. Ao se analisar em conjunto as classes sociais A e B, nota-se que houve maior número de estudantes com *uso na vida* que sem *uso na vida* de drogas – exceto tabaco e álcool (Tabela 2).
- III – Houve diferenças estatisticamente significantes para os tipos de uso (*uso no ano* e *uso no mês*) em que predominou o uso no sexo feminino. As maiores porcentagens de *uso na vida* apareceram a partir dos 18 anos de idade, porém na faixa etária de 10 a 12 anos o *uso na vida* foi de 9,4% (Tabela 3).
- IV – As drogas mais utilizadas (*uso na vida*) pelos estudantes, excetuando-se álcool e tabaco, pela ordem foram: solventes, ansiolíticos, anfetamínicos, maconha, ansiolíticos e cocaína. O uso de energéticos foi de 9,2%. O total estimado de estudantes com *uso na vida*, nas redes estadual e municipal de Macapá, foi de 21,2% – dados expandidos (Tabela 4).
- V – Na Tabela 5 nota-se o predomínio do sexo masculino sobre o feminino, com diferenças estatisticamente significantes para *uso na vida* de maconha, ansiolíticos, energéticos e tabaco. O contrário se observa apenas para os solventes, em que houve maior *uso na vida* no sexo feminino.

Tabela 1: Características sociodemográficas de 610 estudantes das redes municipal e estadual de Macapá.

| Características | | n | % |
|------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Sexo | Masculino | 271 | 44,4 |
| | Feminino | 318 | 52,1 |
| | Não informado | 21 | 3,4 |
| | Total | 610 | 100,0 |
| Faixa etária (anos) | 10-12 | 280 | 45,9 |
| | 13-15 | 217 | 35,6 |
| | 16-18 | 97 | 15,9 |
| | > 18 | 3 | 0,5 |
| | Não informado | 13 | 2,1 |
| Total | 610 | 100,0 | |
| Grau escolar | Fundamental | 486 | 79,7 |
| | Médio | 124 | 20,3 |
| | Total | 610 | 100,0 |
| Defasagem série/idade (anos) | Não tem | 384 | 63,0 |
| | 1 a 2 | 164 | 26,9 |
| | ≥ 3 | 49 | 8,0 |
| | Não informado | 13 | 2,1 |
| Total | 610 | 100,0 | |
| Nível socio-econômico | A | 24 | 3,9 |
| | B | 133 | 21,8 |
| | C | 253 | 41,5 |
| | D | 129 | 21,1 |
| | E | 43 | 7,0 |
| | Não informado | 28 | 4,6 |
| Total | 610 | 100,0 | |

Tabela 2: O uso na vida de drogas psicotrópicas, segundo características sociais de 610 estudantes das redes municipal e estadual de Macapá, dados não expandidos.

| Características | | Uso na vida [†] | | | |
|---|-------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Não | | Sim | |
| | | n | % | n | % |
| Defasagem série/idade (anos) | Não tem | 324 | 66,0 | 60 | 50,4* |
| | 1 a 2 | 125 | 25,5 | 39 | 32,8* |
| | ≥ 3 | 33 | 6,7 | 16 | 13,4* |
| | Não informado | 9 | 1,8 | 4 | 3,4 |
| | Total | 491 | 100,0 | 119 | 100,0 |
| Dias em que faltou à escola nos últimos 30 dias | Vim todos os dias | 283 | 57,6 | 62 | 52,1* |
| | 1 a 3 | 140 | 28,5 | 35 | 29,4 |
| | 4 a 8 | 26 | 5,3 | 7 | 5,9 |
| | ≥ 9 | 29 | 5,9 | 13 | 10,9* |
| | Não informado | 13 | 2,6 | 2 | 1,7 |
| Total | 491 | 100,0 | 119 | 100,0 | |
| Nível socio-econômico [°] | A | 19 | 3,9 | 5 | 4,2 |
| | B | 102 | 20,8 | 31 | 26,1** |
| | C | 214 | 43,6 | 39 | 32,8 |
| | D | 96 | 19,6 | 33 | 27,7 |
| | E | 36 | 7,3 | 7 | 5,9 |
| | Não informado | 24 | 4,9 | 4 | 3,4 |
| Total | 491 | 100,0 | 119 | 100,0 | |

[†] Para definição de *uso na vida*, vide Metodologia.

* Diferença estatisticamente significativa entre *uso na vida*: não e sim. (Teste do χ^2 , $p < 0,05$).

[°] As chaves neste item indicam os agrupamentos feitos para a análise estatística.

** Diferença estatisticamente significativa entre não-usuários e usuários das classes A e B, das classes C, D e E (Teste do χ^2 , $p < 0,05$).

Tabela 3: Uso de drogas psicotrópicas em geral (exceto tabaco e álcool) entre 610 estudantes de ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual do Macapá; dados expressos em porcentagem, levando-se em conta os tipos de uso, conforme sexo e idade.

| Tipos de usos [◇] | Sexo% [‡] | | | Idade (anos)% [‡] | | | | |
|----------------------------|--------------------|-------|-----------------|----------------------------|-------|-------|------|-----------------|
| | M | F | NI [□] | 10-12 | 13-15 | 16-18 | > 18 | NI [□] |
| <i>Uso na vida</i> | 20,3 | 21,5 | 23,4 | 9,4 | 29,6 | 37,8 | 16,7 | 28,3 |
| <i>Uso no ano</i> | 16,4 | 19,4* | 18,7 | 7,5 | 26,7 | 34,6 | 16,7 | 21,7 |
| <i>Uso no mês</i> | 12,7 | 15,5* | 10,3 | 6,2 | 18,5 | 30,3 | 16,7 | 15,0 |
| <i>Uso freqüente</i> | 2,1 | 2,6 | 5,6 | 0,0 | 4,2 | 6,2 | 0,0 | 8,3 |
| <i>Uso pesado</i> | 1,5 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 6,2 | 0,0 | 0,0 |

[◇] Para definição de tipos de usos, vide Metodologia.

[‡] As porcentagens representam os dados expandidos (vide Metodologia); a diferença para 100% em cada tipo de uso representa não-usuários para o mesmo tipo de uso.

[□] NI significa dados não informados pelos alunos.

* Diferença estatisticamente significativa entre os dois sexos (Teste do χ^2 , $p < 0,05$).

Tabela 4: Uso de drogas psicotrópicas por 610 estudantes do ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual de Macapá; dados expressos em porcentagem, levando-se em conta os tipos de usos e as diferentes drogas individualmente.

| Drogas | Tipos de uso % [‡] | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|----------------|--------|-----------|------------|
| | Na vida | No ano | No mês | Frequente | Uso pesado |
| Maconha | 3,0 | 2,5 | 1,8 | 0,3 | 0,0 |
| Cocaína | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 0,4 | 0,4 |
| Crack | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Anfetamínicos | 5,9 | 4,4 | 2,7 | 1,1 | 0,7 |
| Solventes | 14,4 | 12,8 | 8,9 | 0,4 | 0,4 |
| Ansiolíticos | 3,4 | 3,0 | 1,7 | 0,6 | 0,5 |
| Anticolinérgicos | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Barbitúricos | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Opiáceos | 0,2 | – [†] | – | – | – |
| Xaropes | 0,4 | – | – | – | – |
| Alucinógenos | 0,2 | – | – | – | – |
| Orexígenos | 0,0 | – | – | – | – |
| Energéticos | 9,2 | – | – | – | – |
| Esteróides/Anabolizantes | 0,8 | – | – | – | – |
| Total tipos de uso• | 21,2 | 18,1 | 14,0 | 2,5 | 1,8 |
| Tabaco | 19,6 | 12,0 | 8,9 | 2,9 | 2,0 |
| Álcool | 49,3 | 47,7 | 31,9 | 7,8 | 4,8 |

[‡] As porcentagens representam os dados expandidos (vide Metodologia).

[†] O traço (–) indica dados não colhidos.

• Tipos de uso exclui tabaco e álcool. Vide definição de tipos de uso em Metodologia.

Tabela 5: Uso na vida de drogas psicotrópicas por 610 estudantes do ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual de Macapá; dados expressos em porcentagem, levando-se em conta sexo, idade e as diferentes drogas individualmente.

| Drogas | Sexo % [‡] | | | Idade (anos) % [‡] | | | | |
|--------------------------|---------------------|-------|-----------------|-----------------------------|-------|-------|------|-----------------|
| | M | F | NI [□] | 10-12 | 13-15 | 16-18 | > 18 | NI [□] |
| Maconha | 3,7 | 2,1* | 5,6 | 0,0 | 3,0 | 13,2 | 0,0 | 8,3 |
| Cocaína | 1,9 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 8,4 | 16,7 | 0,0 |
| Crack | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Anfetamínicos | 6,0 | 6,0 | 5,6 | 3,6 | 7,4 | 8,6 | 0,0 | 6,7 |
| Solventes | 12,7 | 15,4* | 15,1 | 6,1 | 21,8 | 24,1 | 0,0 | 13,3 |
| Ansiolíticos | 4,9 | 2,3* | 0,0 | 1,5 | 5,1 | 6,2 | 0,0 | 6,7 |
| Anticolinérgicos | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Barbitúricos | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Opiáceos | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Xaropes | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alucinógenos | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Orexígenos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Energéticos | 10,6 | 7,3* | 10,3 | 3,3 | 10,5 | 16,6 | 16,7 | 8,3 |
| Esteróides/Anabolizantes | 0,9 | 0,7 | 0,0 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
| Total tipo de uso• | 20,3 | 21,5 | 20,6 | 9,0 | 29,6 | 35,1 | 16,7 | 29,2 |
| Tabaco | 21,2 | 18,7* | 12,2 | 5,8 | 26,6 | 48,7 | 16,7 | 0,0 |
| Álcool | 51,0 | 49,9 | 11,1 | 25,9 | 64,1 | 80,8 | 33,3 | 20,8 |

[‡] As porcentagens representam os dados expandidos (vide Metodologia).

[□] NI significa dados não informados pelos alunos.

* Para definição para tipos de uso, vide Metodologia.

* Diferença estatisticamente significante entre os dois sexos (Teste do χ^2 , $p < 0,05$).



1. População

| | |
|---------------------------|--|
| • População geral | 405.835 habitantes ^(IBGE, 2004) |
| • População de 10-19 anos | 310.108 habitantes ^(IBGE, 2004) |

2. Estudantes

| Estudantes matriculados em 2004* | | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Ensino | Escola Pública | Escola Privada | Total |
| Fundamental** | 145.954 | 14.184 | 160.138 |
| Médio | 107.580 | 8.777 | 116.357 |
| Total | 253.534 | 22.961 | 276.495 |

*INEP-ME, 2004.

**Alunos matriculados no Ensino Fundamental a partir da 5ª série.

3. Amostra

| | Escolas Públicas* | Escolas Sorteadas | Turmas Sorteadas |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Municipais | 85 | 05 | 24 |
| Estaduais | 175 | 15 | 57 |
| Federais | 03 | 0 | 0 |
| Total | 263 | 20 | 81 |

*INEP-ME, 2003.

| Questionários | Aplicados | 2.152 |
|---------------|----------------|--------------|
| | Em branco | 28 |
| | Excluídos | 06 |
| | Válidos | 2.118 |

Manaus-AM

Equipe

supervisão

Veremity Santos Pereira

coordenação

Marcela Andréa Pereira Moraes

entrevistadores

Denís Alvaci conceição

Emerson Diniz de Souza

Isabel Pereira Garcia

Keilâni Marciane do Nascimento Barbosa

Kelry Cristiany Felix Trindade

Vera Lúcia Marque Ferreira

SINOPSE

- I – A amostra obtida em Manaus constituiu-se de 2.118 estudantes, sendo 48,4% do sexo feminino. Apenas 12,7% da amostra possuía mais de 18 anos de idade, e 61,9% dos estudantes cursavam o ensino fundamental no momento da pesquisa. Havia 38,0% dos alunos com defasagem escolar, e 19,2% da amostra pertencia às classes sociais A ou B (Tabela 1).
- II – Os alunos que não tinham feito *uso na vida* apresentaram menos defasagem escolar (33,3%) que com *uso na vida* (59,8%). Quanto às faltas, os sem *uso na vida* compareceram mais às aulas que aqueles com uso (exceto tabaco e álcool). Não houve diferenças estatísticas quando se comparam a presença ou não de *uso na vida* e as classes sociais a que pertenciam (Tabela 2).
- III – Houve diferenças estatísticas com relação ao uso de drogas entre os sexos masculino e feminino para os tipos de uso (*uso no ano, mês, freqüente e pesado*). As faixas etárias com maior número de usuários foram de 16 a 18 e acima de 18 anos, porém na faixa etária de 10 a 12 anos observou-se que 13,6% dos estudantes já haviam feito *uso na vida* de drogas (Tabela 3).
- IV – Exceto o álcool e o tabaco, as drogas mais utilizadas (*uso na vida*) pela ordem foram: solventes, maconha, cocaína, ansiolíticos e anfetamínicos, enquanto o *uso na vida* de energéticos foi de 7,8%. O total estimado de estudantes com *uso na vida*, das redes municipal e estadual de ensino de Manaus, foi de 23,2% – dados expandidos (Tabela 4).
- V – Maconha, cocaína, energéticos, esteróides anabolizantes, tabaco e álcool tiveram mais *uso na vida* pelos alunos do sexo masculino quando comparados ao do feminino. O contrário foi observado para os ansiolíticos e os orexígenos. O *uso na vida* de solventes na faixa etária de 10 a 12 anos chegou a 12,6% dos estudantes (Tabela 5).

Tabela 1: Características sociodemográficas de 2.118 estudantes das redes municipal e estadual de Manaus.

| Características | | n | % |
|------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Sexo | Masculino | 846 | 39,9 |
| | Feminino | 1026 | 48,4 |
| | Não informado | 246 | 11,6 |
| | Total | 2118 | 100,0 |
| Faixa etária (anos) | 10-12 | 439 | 20,7 |
| | 13-15 | 589 | 27,8 |
| | 16-18 | 523 | 24,7 |
| | > 18 | 269 | 12,7 |
| | Não informado | 298 | 14,1 |
| Total | 2118 | 100,0 | |
| Grau escolar | Fundamental | 1312 | 61,9 |
| | Médio | 806 | 38,1 |
| | Total | 2118 | 100,0 |
| Defasagem série/idade (anos) | Não tem | 666 | 31,4 |
| | 1 a 2 | 647 | 30,5 |
| | ≥ 3 | 507 | 23,9 |
| | Não informado | 298 | 14,1 |
| Total | 2118 | 100,0 | |
| Nível socio-econômico | A | 51 | 2,4 |
| | B | 355 | 16,8 |
| | C | 924 | 43,6 |
| | D | 534 | 25,2 |
| | E | 175 | 8,3 |
| | Não informado | 79 | 3,7 |
| Total | 2118 | 100,0 | |

Tabela 2: O uso na vida de drogas psicotrópicas, segundo características sociais de 2.118 estudantes das redes municipal e estadual de Manaus, dados não expandidos.

| Características | | Uso na vida [‡] | | | |
|---|-------------------|--------------------------|------------|--------------|-------|
| | | Não | | Sim | |
| | | n | % | n | % |
| Defasagem série/idade (anos) | Não tem | 542 | 33,3 | 124 | 25,2* |
| | 1 a 2 | 507 | 31,2 | 140 | 28,5 |
| | ≥ 3 | 353 | 21,7 | 154 | 31,3* |
| | Não informado | 224 | 13,8 | 74 | 15,0 |
| Total | 1626 | 100,0 | 492 | 100,0 | |
| Dias em que faltou à escola nos últimos 30 dias | Vim todos os dias | 1032 | 63,5 | 241 | 49,0* |
| | 1 a 3 | 402 | 24,7 | 158 | 32,1* |
| | 4 a 8 | 82 | 5,0 | 45 | 9,1* |
| | ≥ 9 | 52 | 3,2 | 31 | 6,3* |
| | Não informado | 58 | 3,6 | 17 | 3,5 |
| Total | 1626 | 100,0 | 492 | 100,0 | |
| Nível socio-econômico [°] | A | 33 | 2,0 | 18 | 3,7 |
| | B | 269 | 16,5 | 86 | 17,5 |
| | C | 715 | 44,0 | 209 | 42,5 |
| | D | 413 | 25,4 | 121 | 24,6 |
| | E | 136 | 8,4 | 39 | 7,9 |
| | Não informado | 60 | 3,7 | 19 | 3,9 |
| Total | 1626 | 100,0 | 492 | 100,0 | |

[‡] Para definição de *uso na vida*, vide Metodologia.

* Diferença estatisticamente significativa entre *uso na vida*: não e sim. (Teste do χ^2 , $p < 0,05$).

[°] As chaves neste item indicam os agrupamentos feitos para a análise estatística.

Tabela 3: Uso de drogas psicotrópicas em geral (exceto tabaco e álcool) entre 2.118 estudantes do ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual de Manaus; dados expressos em porcentagem, levando-se em conta os tipos de usos, conforme sexo e idade.

| Tipos de usos [◇] | Sexo% [‡] | | | Idade (anos)% [‡] | | | | |
|----------------------------|--------------------|------|-----------------|----------------------------|-------|-------|------|-----------------|
| | M | F | NI [□] | 10-12 | 13-15 | 16-18 | > 18 | NI [□] |
| <i>Uso na vida</i> | 23,7 | 22,6 | 27,9 | 13,6 | 24,4 | 25,7 | 31,5 | 24,9 |
| <i>Uso no ano</i> | 20,4 | 18,3 | 23,8 | 10,2 | 21,6 | 22,4 | 24,9 | 20,5 |
| <i>Uso no mês</i> | 16,6 | 14,1 | 20,4 | 7,5 | 15,1 | 18,6 | 21,7 | 17,9 |
| <i>Uso freqüente</i> | 2,8 | 1,8 | 2,6 | 1,1 | 1,3 | 3,4 | 3,5 | 3,0 |
| <i>Uso pesado</i> | 2,1 | 0,8 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 2,3 | 2,1 | 1,7 |

[◇] Para definição de tipos de usos, vide Metodologia.

[‡] As porcentagens representam os dados expandidos (vide Metodologia); a diferença para 100% em cada tipo de uso representa não-usuários para o mesmo tipo de uso.

[□] NI significa dados não informados pelos alunos.

Tabela 4: Uso de drogas psicotrópicas por 2.118 estudantes do ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual de Manaus; dados expressos em porcentagem, levando-se em conta as categorias e as diferentes drogas individualmente.

| Drogas | Tipos de uso % [‡] | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|----------------|--------|-----------|------------|
| | Na vida | No ano | No mês | Frequente | Uso pesado |
| Maconha | 7,7 | 5,7 | 4,1 | 0,5 | 0,5 |
| Cocaína | 4,4 | 3,9 | 3,0 | 0,5 | 0,3 |
| Crack | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| Anfetamínicos | 1,6 | 1,3 | 1,0 | 0,3 | 0,2 |
| Solventes | 15,9 | 14,1 | 10,6 | 1,2 | 0,4 |
| Ansiolíticos | 2,1 | 2,0 | 1,4 | 0,2 | 0,1 |
| Anticolinérgicos | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Barbitúricos | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Opiáceos | 0,2 | – [†] | – | – | – |
| Xaropes | 0,3 | – | – | – | – |
| Alucinógenos | 0,3 | – | – | – | – |
| Orexígenos | 0,6 | – | – | – | – |
| Energéticos | 7,8 | – | – | – | – |
| Esteróides/Anabolizantes | 2,9 | – | – | – | – |
| Total tipos de uso• | 23,2 | 19,3 | 15,3 | 2,3 | 1,4 |
| Tabaco | 32,0 | 19,5 | 12,7 | 4,6 | 3,0 |
| Álcool | 60,3 | 57,9 | 40,6 | 7,7 | 4,2 |

[‡] As porcentagens representam os dados expandidos (vide Metodologia).

[†] O traço (–) indica dados não colhidos.

• Tipos de uso exclui tabaco e álcool. Vide definição de tipos de uso em Metodologia.

Tabela 5: *Uso na vida* de drogas psicotrópicas por 2.118 estudantes do ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual de Manaus; dados expressos em porcentagem, levando-se em conta sexo, idade e as diferentes drogas individualmente.

| Drogas | Sexo % [‡] | | | Idade (anos) % [‡] | | | | |
|--------------------------|---------------------|-------|-----------------|-----------------------------|-------|-------|------|-----------------|
| | M | F | NI [□] | 10-12 | 13-15 | 16-18 | > 18 | NI [□] |
| Maconha | 11,5 | 4,3* | 12,8 | 1,0 | 4,4 | 10,8 | 16,5 | 10,9 |
| Cocaína | 6,2 | 2,4* | 10,5 | 0,3 | 2,3 | 4,7 | 11,7 | 7,1 |
| Crack | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,8 | 2,1 |
| Anfetamínicos | 1,6 | 1,9 | 1,1 | 0,3 | 2,3 | 1,8 | 1,4 | 1,9 |
| Solventes | 15,6 | 16,8 | 18,2 | 12,6 | 19,5 | 15,7 | 18,4 | 13,9 |
| Ansiolíticos | 1,3 | 2,7* | 2,2 | 0,9 | 2,0 | 2,4 | 2,3 | 3,4 |
| Anticolinérgicos | 0,8 | 0,5 | 1,7 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 1,7 |
| Barbitúricos | 0,1 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,0 |
| Opiáceos | 0,2 | 0,1 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,9 |
| Xaropes | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 0,0 |
| Alucinógenos | 0,2 | 0,2 | 1,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,8 |
| Orexígenos | 0,1 | 1,1* | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,7 | 1,4 | 0,5 |
| Energéticos | 10,1 | 5,4* | 13,9 | 2,8 | 6,7 | 11,5 | 8,4 | 9,2 |
| Esteróides/Anabolizantes | 4,4 | 1,1* | 9,1 | 0,7 | 1,1 | 4,5 | 4,2 | 4,2 |
| Total tipos de uso• | 23,7 | 22,6 | 27,9 | 15,1 | 23,3 | 29,7 | 34,5 | 29,8 |
| Tabaco | 35,2 | 29,1* | 37,0 | 11,5 | 30,4 | 51,3 | 48,0 | 42,4 |
| Álcool | 62,5 | 58,6* | 63,9 | 26,6 | 60,9 | 81,6 | 83,8 | 69,4 |

[‡] As porcentagens representam os dados expandidos (vide Metodologia).

[□] NI significa dados não informados pelos alunos.

• Para definição para tipos de uso, vide Metodologia.

* Diferença estatisticamente significante entre os dois sexos (Teste do χ^2 , $p < 0,05$).



1. População

| | |
|---------------------------|--|
| • População geral | 137.355 habitantes ^(IBGE, 2004) |
| • População de 10-19 anos | 30.470 habitantes ^(IBGE, 2004) |

2. Estudantes

| Estudantes matriculados em 2004* | | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Ensino | Escola Pública | Escola Privada | Total |
| Fundamental** | 12.109 | 1.792 | 13.901 |
| Médio | 10.658 | 1.473 | 12.131 |
| Total | 22.767 | 3.265 | 26.032 |

*INEP-ME, 2004.

**Alunos matriculados no Ensino Fundamental a partir da 5ª série.

3. Amostra

| | Escolas Públicas* | Escolas Sorteadas | Turmas Sorteadas |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Municipais | 21 | 05 | 21 |
| Estaduais | 19 | 07 | 30 |
| Federais | 0 | 0 | 0 |
| Total | 40 | 12 | 81 |

*INEP-ME, 2003.

| Questionários | Aplicados | 1.227 |
|---------------|----------------|--------------|
| | Em branco | 04 |
| | Excluídos | 04 |
| | Válidos | 1.219 |

Palmas–TO

Equipe

supervisão

Osmailde Souza Lacerda

coordenação

Maria Nadir da Conceição Santos

entrevistadora

Edinalva Maria Gomes

SINOPSE

- I – A amostra constou de 1.219 estudantes, sendo a maior porcentagem do sexo feminino (52,4%). Parte predominante da amostra concentra-se na faixa etária de 13 a 15 anos (42,6%), sendo que 80,3% dos estudantes encontravam-se no ensino fundamental. Em Palmas 41,6% dos estudantes apresentaram defasagem escolar, sendo que somente 19,9% da amostra pertencia às classes sociais A ou B (Tabela 1).
- II – Na comparação entre presença ou não de *uso na vida* houve maior porcentagem de estudantes que já fizeram *uso na vida* de drogas (exceto tabaco e álcool) com defasagem escolar quando comparados aos sem uso. Entre os sem *uso na vida* é menor o número de faltas à escola que entre os com *uso na vida*. Houve mais estudantes com *uso na vida* pertencentes às classes sociais A ou B que aqueles sem uso para essas mesmas classes sociais (Tabela 2).
- III – Em 2 tipos de uso (*uso na vida* e *uso no ano*) houve predomínio estatisticamente significativo do sexo feminino sobre o masculino. O *uso freqüente* foi maior para o masculino, embora nas faixas etárias a partir de 16-18 anos apareçam as maiores porcentagens de *uso na vida*, já entre 10 e 12 anos observa-se número significativo de usuários, com 13,2% (Tabela 3).
- IV – As drogas mais utilizadas pelos estudantes, excetuando-se álcool e tabaco, pela ordem foram: solventes, maconha, anfetamínicos e ansiolíticos. Os energéticos foram usados por 10,7%. A estimativa total de estudantes com *uso na vida*, nas redes municipal e estadual de ensino em Palmas, foi de 19,8% – dados expandidos (Tabela 4).
- V – Houve predomínio de *uso na vida* para o sexo masculino sobre o feminino, com diferenças estatisticamente significantes para maconha, energéticos e tabaco. O contrário acontece para os anfetamínicos e ansiolíticos, os quais são mais usados pelas mulheres. Na faixa etária de 10 a 12 anos, o uso de solventes aparece com 11,8% do total de estudantes dessa faixa etária (Tabela 5).

Tabela 1: Características sociodemográficas de 1.219 estudantes das redes municipal e estadual de Palmas.

| Características | | n | % |
|------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Sexo | Masculino | 565 | 46,3 |
| | Feminino | 639 | 52,4 |
| | Não informado | 15 | 1,2 |
| | Total | 1219 | 100,0 |
| Faixa etária (anos) | 10-12 | 382 | 31,3 |
| | 13-15 | 519 | 42,6 |
| | 16-18 | 206 | 16,9 |
| | > 18 | 65 | 5,3 |
| | Não informado | 47 | 3,9 |
| | Total | 1219 | 100,0 |
| Grau escolar | Fundamental | 979 | 80,3 |
| | Médio | 240 | 19,7 |
| | Total | 1219 | 100,0 |
| Defasagem série/idade (anos) | Não tem | 665 | 54,6 |
| | 1 a 2 | 357 | 29,3 |
| | ≥ 3 | 150 | 12,3 |
| | Não informado | 47 | 3,9 |
| | Total | 1219 | 100,0 |
| Nível socio-econômico | A | 34 | 2,8 |
| | B | 208 | 17,1 |
| | C | 503 | 41,3 |
| | D | 291 | 23,9 |
| | E | 112 | 9,2 |
| | Não informado | 71 | 5,8 |
| Total | 1219 | 100,0 | |

Tabela 2: O uso na vida de drogas psicotrópicas, segundo características sociais de 1.219 estudantes das redes municipal e estadual de Palmas, dados não expandidos.

| Características | | Uso na vida [†] | | | |
|---|-------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Não | | Sim | |
| | | n | % | n | % |
| Defasagem série/idade (anos) | Não tem | 542 | 55,4 | 123 | 51,3 |
| | 1 a 2 | 294 | 30,0 | 63 | 26,3 |
| | ≥ 3 | 108 | 11,0 | 42 | 17,5* |
| | Não informado | 35 | 3,6 | 12 | 5,0 |
| | Total | 979 | 100,0 | 240 | 100,0 |
| Dias em que faltou à escola nos últimos 30 dias | Vim todos os dias | 604 | 61,7 | 111 | 46,3* |
| | 1 a 3 | 277 | 28,3 | 79 | 32,9 |
| | 4 a 8 | 41 | 4,2 | 21 | 8,8* |
| | ≥ 9 | 22 | 2,2 | 19 | 7,9* |
| | Não informado | 35 | 3,6 | 10 | 4,2 |
| Total | 979 | 100,0 | 240 | 100,0 | |
| Nível socio-econômico [°] | A | 29 | 3,0 | 5 | 2,1 |
| | B | 149 | 15,2 | 59 | 24,6** |
| | C | 409 | 41,8 | 94 | 39,2 |
| | D | 240 | 24,5 | 51 | 21,3 |
| | E | 93 | 9,5 | 19 | 7,9** |
| | Não informado | 59 | 6,0 | 12 | 5,0 |
| Total | 979 | 100,0 | 240 | 100,0 | |

[†] Para definição de *uso na vida*, vide Metodologia.

* Diferença estatisticamente significativa entre *uso na vida*: não e sim. (Teste do χ^2 , $p < 0,05$).

[°] As chaves neste item indicam os agrupamentos feitos para a análise estatística.

** Diferença estatisticamente significativa entre não-usuários e usuários das classes A e B, das classes C, D e E (Teste do χ^2 , $p < 0,05$).

Tabela 3: Uso de drogas psicotrópicas em geral (exceto tabaco e álcool) entre 1.219 estudantes do ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual de Palmas; dados expressos em porcentagem, levando-se em conta os tipos de usos, conforme sexo e idade.

| Tipos de usos [◇] | Sexo% [‡] | | | Idade (anos)% [‡] | | | | |
|----------------------------|--------------------|------|-----------------|----------------------------|-------|-------|------|-----------------|
| | M | F | NI [□] | 10-12 | 13-15 | 16-18 | > 18 | NI [□] |
| <i>Uso na vida</i> | 18,6 | 20,8 | 6,3 | 13,2 | 20,8 | 24,8 | 15,7 | 39,5 |
| <i>Uso no ano</i> | 17,2 | 19,0 | 6,3 | 11,0 | 19,3 | 25,3 | 11,6 | 37,1 |
| <i>Uso no mês</i> | 12,4 | 13,9 | 4,2 | 8,5 | 11,8 | 19,9 | 9,9 | 15,1 |
| <i>Uso freqüente</i> | 3,8 | 2,6 | 2,1 | 1,0 | 2,6 | 6,8 | 1,7 | 1,5 |
| <i>Uso pesado</i> | 2,7 | 2,0 | 2,1 | 0,8 | 1,9 | 4,3 | 1,7 | 1,5 |

[◇] Para definição de tipos de usos, vide Metodologia.

[‡] As porcentagens representam os dados expandidos (vide Metodologia); a diferença para 100% em cada tipo de uso representa não-usuários para o mesmo tipo de uso.

[□] NI significa dados não informados pelos alunos.

Tabela 4: Uso de drogas psicotrópicas por 1.219 estudantes do ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual de Palmas; dados expressos em porcentagem, levando-se em conta as categorias e as diferentes drogas individualmente.

| Drogas | Tipos de uso % [‡] | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|----------------|--------|-----------|------------|
| | Na vida | No ano | No mês | Frequente | Uso pesado |
| Maconha | 4,4 | 3,4 | 1,9 | 0,6 | 0,4 |
| Cocaína | 0,9 | 1,1 | 0,5 | 0,2 | 0,2 |
| Crack | 0,9 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |
| Anfetamínicos | 3,5 | 3,7 | 2,0 | 0,6 | 0,3 |
| Solventes | 14,0 | 13,2 | 9,3 | 1,9 | 1,4 |
| Ansiolíticos | 2,6 | 2,5 | 1,2 | 0,1 | 0,0 |
| Anticolinérgicos | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Barbitúricos | 0,8 | 0,9 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
| Opiáceos | 0,2 | – [†] | – | – | – |
| Xaropes | 0,2 | – | – | – | – |
| Alucinógenos | 0,4 | – | – | – | – |
| Orexígenos | 0,8 | – | – | – | – |
| Energéticos | 10,7 | – | – | – | – |
| Esteróides/Anabolizantes | 0,3 | – | – | – | – |
| Total tipos de uso• | 19,8 | 18,1 | 13,1 | 3,2 | 2,4 |
| Tabaco | 16,4 | 10,2 | 5,3 | 1,5 | 1,1 |
| Álcool | 58,2 | 56,7 | 39,6 | 10,3 | 6,0 |

[‡] As porcentagens representam os dados expandidos (vide Metodologia).

[†] O traço (–) indica dados não colhidos.

• Tipos de uso exclui tabaco e álcool. Vide definição de tipos de uso em Metodologia.

Tabela 5: *Uso na vida* de drogas psicotrópicas por 1.219 estudantes do ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual de Palmas; dados expressos em porcentagem, levando-se em conta sexo, idade e as diferentes drogas individualmente.

| Drogas | Sexo % [‡] | | | Idade (anos) % [‡] | | | | |
|--------------------------|---------------------|-------|-----------------|-----------------------------|-------|-------|------|-----------------|
| | M | F | NI [□] | 10-12 | 13-15 | 16-18 | > 18 | NI [□] |
| Maconha | 5,9 | 3,2* | 0,0 | 0,4 | 2,2 | 10,8 | 9,5 | 13,7 |
| Cocaína | 1,2 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 3,2 | 2,4 | 0,7 |
| Crack | 0,9 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 4,5 | 1,7 | 0,0 |
| Anfetamínicos | 2,9 | 4,2* | 0,0 | 1,0 | 3,2 | 6,3 | 0,0 | 3,9 |
| Solventes | 12,9 | 14,9 | 6,3 | 11,8 | 14,9 | 16,9 | 6,5 | 32,5 |
| Ansiolíticos | 1,2 | 3,9* | 0,0 | 0,6 | 3,6 | 4,4 | 0,0 | 0,7 |
| Anticolinérgicos | 0,3 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,4 | 2,1 | 0,7 |
| Barbitúricos | 0,9 | 0,7 | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 1,7 | 0,7 |
| Opiáceos | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| Xaropes | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alucinógenos | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,4 | 0,0 | 0,7 |
| Orexígenos | 0,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 3,1 |
| Energéticos | 13,2 | 8,4* | 16,7 | 2,9 | 12,0 | 19,2 | 15,0 | 3,9 |
| Esteróides/Anabolizantes | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Total tipos de uso• | 18,6 | 20,8 | 6,3 | 13,2 | 20,8 | 24,8 | 15,7 | 39,5 |
| Tabaco | 19,5 | 13,8* | 0,0 | 5,1 | 13,3 | 37,3 | 16,2 | 29,0 |
| Álcool | 59,6 | 57,4 | 25,0 | 35,9 | 62,2 | 75,4 | 55,5 | 73,0 |

[‡] As porcentagens representam os dados expandidos (vide Metodologia).

[□] NI significa dados não informados pelos alunos.

• Para definição para tipos de uso, vide Metodologia.

* Diferença estatisticamente significante entre os dois sexos (Teste do χ^2 , $p < 0,05$).



1. População

| | |
|---------------------------|--|
| • População geral | 334.669 habitantes ^(IBGE, 2004) |
| • População de 10-19 anos | 77.208 habitantes ^(IBGE, 2004) |

2. Estudantes

| Estudantes matriculados em 2004* | | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Ensino | Escola Pública | Escola Privada | Total |
| Fundamental** | 28.441 | 3.936 | 32.377 |
| Médio | 9.747 | 2.876 | 12.623 |
| Total | 38.188 | 6.812 | 45.000 |

*INEP-ME, 2004.

**Alunos matriculados no Ensino Fundamental a partir da 5ª série.

3. Amostra

| | Escolas Públicas* | Escolas Sorteadas | Turmas Sorteadas |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Municipais | 10 | 0 | 0 |
| Estaduais | 45 | 12 | 68 |
| Federais | 0 | 0 | 0 |
| Total | 55 | 12 | 68 |

*INEP-ME, 2003.

| Questionários | Aplicados | 1.657 |
|---------------|----------------|--------------|
| | Em branco | 03 |
| | Excluídos | 06 |
| | Válidos | 1.648 |

Porto Velho–RO

Equipe

supervisão e coordenação

João Rodrigues da Silva

entrevistador

Heles Alberto Moreira de Sousa

SINOPSE

- I – A amostra constou de 1.648 estudantes, sendo semelhante a distribuição entre os sexos. Parte predominante da amostra concentra-se na faixa etária de 13 a 15 anos (35,2%), sendo que 78,3% dos estudantes se encontravam no ensino fundamental. Em Porto Velho, 61,7% dos estudantes apresentaram defasagem escolar, sendo que somente 17,5% da amostra pertencia às classes sociais A ou B (Tabela 1).
- II – Na comparação entre os estudantes com ou sem *uso na vida* houve maior porcentagem de estudantes com *uso na vida* e defasagem escolar quando comparados aos sem uso de drogas (exceto tabaco e álcool). Entre os sem *uso na vida*, é menor o número de faltas à escola que entre aqueles que fizeram *uso na vida*. Houve mais alunos com *uso na vida* pertencentes às classes sociais A ou B que sem *uso na vida* para essas mesmas classes sociais (Tabela 2).
- III – Não houve predomínio estatisticamente significativo dos diferentes tipos de usos (*uso na vida, ano, mês, freqüente e pesado*) na comparação dos sexos. Nas faixas etárias de 16 a 18 anos e a partir de 18 anos apareceram as maiores porcentagens de *uso na vida*, já entre 10 e 12 anos observaram porcentagens de estudantes com *uso na vida* de drogas, exceto tabaco e álcool, com 11,0% (Tabela 3).
- IV – As drogas mais utilizadas pelos estudantes, excetuando-se álcool e tabaco, pela ordem foram: solventes, maconha, anfetamínicos e empacotados a cocaína e os ansiolíticos. O *uso na vida* de energéticos foi de 7,0%. A estimativa total de estudantes com *uso na vida* nas redes municipal e estadual de ensino de Porto Velho foi de 21,8% – dados expandidos (Tabela 4).
- V – Houve predomínio de *uso na vida* para o sexo masculino sobre o feminino com diferenças estatisticamente significantes para maconha, cocaína, energéticos e esteróides anabolizantes. O contrário acontece para os anfetamínicos e ansiolíticos, os quais são mais usados pelas mulheres. Na faixa etária de 10 a 12 anos, o uso de solventes aparece com 1,8% do total de estudantes dessa faixa etária (Tabela 5).

Tabela 1: Características sociodemográficas de 1.648 estudantes das redes municipal e estadual de Porto Velho.

| Características | | n | % |
|------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Sexo | Masculino | 792 | 48,1 |
| | Feminino | 785 | 47,6 |
| | Não informado | 71 | 4,3 |
| | Total | 1648 | 100,0 |
| Faixa etária (anos) | 10-12 | 389 | 23,6 |
| | 13-15 | 580 | 35,2 |
| | 16-18 | 346 | 21,0 |
| | > 18 | 181 | 11,0 |
| | Não informado | 152 | 9,2 |
| Total | 1648 | 100,0 | |
| Grau escolar | Fundamental | 1290 | 78,3 |
| | Médio | 358 | 21,7 |
| | Total | 1648 | 100,0 |
| Defasagem série/idade (anos) | Não tem | 478 | 29,0 |
| | 1 a 2 | 645 | 39,1 |
| | ≥ 3 | 373 | 22,6 |
| | Não informado | 152 | 9,2 |
| Total | 1648 | 100,0 | |
| Nível socio-econômico | A | 32 | 1,9 |
| | B | 257 | 15,6 |
| | C | 705 | 42,8 |
| | D | 438 | 26,6 |
| | E | 124 | 7,5 |
| | Não informado | 92 | 5,6 |
| Total | 1648 | 100,0 | |

Tabela 2: O uso na vida de drogas psicotrópicas, segundo características sociais de 1.640 estudantes das redes municipal e estadual de Porto Velho, dados não expandidos.

| Características | | Uso na vida [†] | | | |
|---|-------------------|--------------------------|------------|--------------|--------|
| | | Não | | Sim | |
| | | n | % | n | % |
| Defasagem série/idade (anos) | Não tem | 406 | 31,6 | 72 | 19,8* |
| | 1 a 2 | 512 | 39,8 | 133 | 36,6 |
| | ≥ 3 | 255 | 19,8 | 118 | 32,5* |
| | Não informado | 112 | 8,7 | 40 | 11,0 |
| Total | 1285 | 100,0 | 363 | 100,0 | |
| Dias em que faltou à escola nos últimos 30 dias | Vim todos os dias | 836 | 65,1 | 195 | 53,7* |
| | 1 a 3 | 299 | 23,3 | 100 | 27,5* |
| | 4 a 8 | 65 | 5,1 | 32 | 8,8* |
| | ≥ 9 | 26 | 2,0 | 19 | 5,2* |
| | Não informado | 59 | 4,6 | 17 | 4,7 |
| Total | 1285 | 100,0 | 363 | 100,0 | |
| Nível socio-econômico [°] | A | 20 | 1,6 | 12 | 3,3 |
| | B | 185 | 14,4 | 72 | 19,8** |
| | C | 552 | 43,0 | 153 | 42,1 |
| | D | 353 | 27,5 | 85 | 23,4 |
| | E | 98 | 7,6 | 26 | 7,2 |
| | Não informado | 77 | 6,0 | 15 | 4,1 |
| Total | 1285 | 100,0 | 363 | 100,0 | |

[†] Para definição de *uso na vida*, vide Metodologia.

* Diferença estatisticamente significativa entre *uso na vida*: não e sim. (Teste do χ^2 , $p < 0,05$).

[°] As chaves neste item indicam os agrupamentos feitos para a análise estatística.

** Diferença estatisticamente significativa entre não-usuários e usuários das classes A e B, das classes C, D e E (Teste do χ^2 , $p < 0,05$).

Tabela 3: Uso de drogas psicotrópicas em geral (exceto tabaco e álcool) entre 1.648 estudantes do ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual de Porto Velho; dados expressos em porcentagem, levando-se em conta os tipos de usos, conforme sexo e idade.

| Tipos de usos [◇] | Sexo% [‡] | | | Idade (anos)% [‡] | | | | |
|----------------------------|--------------------|------|-----------------|----------------------------|-------|-------|------|-----------------|
| | M | F | NI [□] | 10-12 | 13-15 | 16-18 | > 18 | NI [□] |
| <i>Uso na vida</i> | 22,1 | 22,3 | 12,2 | 11,0 | 20,9 | 25,8 | 50,6 | 29,5 |
| <i>Uso no ano</i> | 17,1 | 17,0 | 11,7 | 8,1 | 16,2 | 21,2 | 19,9 | 22,9 |
| <i>Uso no mês</i> | 13,5 | 12,6 | 8,9 | 6,0 | 11,9 | 17,4 | 14,7 | 20,5 |
| <i>Uso freqüente</i> | 2,1 | 1,6 | 0,0 | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 2,4 | 8,6 |
| <i>Uso pesado</i> | 1,5 | 1,3 | 0,0 | 0,7 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 8,6 |

[◇] Para definição de tipos de usos, vide Metodologia.

[‡] As porcentagens representam os dados expandidos (vide Metodologia); a diferença para 100% em cada tipo de uso representa não-usuários para o mesmo tipo de uso.

[□] NI significa dados não informados pelos alunos.

Tabela 4: Uso de drogas psicotrópicas por 1.648 estudantes do ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual de Porto Velho; dados expressos em porcentagem, levando-se em conta as categorias e as diferentes drogas individualmente.

| Drogas | Tipos de uso % [‡] | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|------------------|-------------------|
| | <i>Na vida</i> | <i>No ano</i> | <i>No mês</i> | <i>Frequente</i> | <i>Uso pesado</i> |
| Maconha | 5,8 | 4,2 | 2,8 | 0,4 | 0,3 |
| Cocaína | 3,5 | 2,4 | 1,9 | 0,1 | 0,1 |
| Crack | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Anfetamínicos | 4,0 | 3,1 | 1,5 | 0,2 | 0,1 |
| Solventes | 12,4 | 10,4 | 7,7 | 0,8 | 0,6 |
| Ansiolíticos | 3,5 | 2,7 | 1,7 | 0,2 | 0,1 |
| Anticolinérgicos | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,1 |
| Barbitúricos | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,1 |
| Opiáceos | 0,2 | – [†] | – | – | – |
| Xaropes | 0,2 | – | – | – | – |
| Alucinógenos | 0,2 | – | – | – | – |
| Orexígenos | 0,6 | – | – | – | – |
| Energéticos | 7,0 | – | – | – | – |
| Esteróides/Anabolizantes | 0,7 | – | – | – | – |
| Total tipos de uso• | 21,8 | 16,9 | 12,9 | 1,7 | 1,3 |
| Tabaco | 25,4 | 17,2 | 11,5 | 4,6 | 3,3 |
| Álcool | 59,8 | 57,4 | 40,2 | 7,9 | 5,0 |

[‡] As porcentagens representam os dados expandidos (vide Metodologia).

[†] O traço (–) indica dados não colhidos.

• Tipos de uso exclui tabaco e álcool. Vide definição de tipos de uso em Metodologia.

Tabela 5: *Uso na vida* de drogas psicotrópicas por 1.648 estudantes do ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual de Porto Velho; dados expressos em porcentagem, levando-se em conta sexo, idade e as diferentes drogas individualmente.

| Drogas | Sexo % [‡] | | | Idade (anos) % [‡] | | | | |
|--------------------------|---------------------|------|-----------------|-----------------------------|-------|-------|------|-----------------|
| | M | F | NI [□] | 10-12 | 13-15 | 16-18 | > 18 | NI [□] |
| Maconha | 7,9 | 3,9* | 2,6 | 0,2 | 2,3 | 11,5 | 13,8 | 16,7 |
| Cocaína | 5,2 | 2,2* | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 4,4 | 8,9 | 14,0 |
| Crack | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,3 | 2,8 |
| Anfetamínicos | 2,6 | 5,4* | 1,7 | 1,5 | 3,1 | 4,7 | 5,3 | 5,3 |
| Solventes | 12,9 | 12,5 | 6,9 | 8,1 | 13,9 | 13,4 | 11,0 | 16,4 |
| Ansiolíticos | 2,8 | 4,4* | 2,7 | 1,8 | 2,7 | 5,2 | 29,1 | 3,7 |
| Anticolinérgicos | 0,7 | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,0 |
| Barbitúricos | 0,5 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 0,9 | 0,2 | 0,7 |
| Opiáceos | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,0 |
| Xaropes | 0,2 | 0,1 | 1,7 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
| Alucinógenos | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Orexígenos | 0,4 | 1,0 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 1,2 |
| Energéticos | 9,4 | 5,1* | 1,1 | 2,0 | 6,5 | 11,5 | 12,1 | 6,4 |
| Esteróides/Anabolizantes | 1,2 | 0,1* | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,3 | 0,7 |
| Total tipos de uso• | 22,1 | 22,3 | 12,2 | 11,9 | 20,0 | 26,3 | 36,6 | 27,5 |
| Tabaco | 27,0 | 24,2 | 19,6 | 4,4 | 20,1 | 39,2 | 40,3 | 41,4 |
| Álcool | 58,5 | 61,8 | 45,0 | 33,1 | 58,1 | 74,8 | 80,4 | 71,3 |

[‡] As porcentagens representam os dados expandidos (vide Metodologia).

[□] NI significa dados não informados pelos alunos.

• Para definição para tipos de uso, vide Metodologia.

* Diferença estatisticamente significante entre os dois sexos (Teste do χ^2 , $p < 0,05$).



1. População

| | |
|---------------------------|--|
| • População geral | 253.059 habitantes ^(IBGE, 2004) |
| • População de 10-19 anos | 57.946 habitantes ^(IBGE, 2004) |

2. Estudantes

| Estudantes matriculados em 2004* | | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Ensino | Escola Pública | Escola Privada | Total |
| Fundamental** | 22.174 | 3.330 | 25.504 |
| Médio | 14.709 | 2.142 | 16.851 |
| Total | 36.883 | 5.472 | 42.355 |

*INEP-ME, 2004.

**Alunos matriculados no Ensino Fundamental a partir da 5ª série.

3. Amostra

| | Escolas Públicas* | Escolas Sorteadas | Turmas Sorteadas |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Municipais | 07 | 02 | 08 |
| Estaduais | 37 | 10 | 44 |
| Federais | 01 | 0 | 0 |
| Total | 45 | 12 | 52 |

*INEP-ME, 2003.

| | | |
|----------------------|----------------|--------------|
| Questionários | Aplicados | 1.549 |
| | Em branco | 06 |
| | Excluídos | 07 |
| | Válidos | 1.536 |

Rio Branco-AC

Equipe

supervisão e coordenação

Creso Machado Lopes

entrevistadores

Andréa Ramos da Silva

Marcos Venicius Malveira de Lima

Relben Ferreira da Silva

SINOPSE

- I – A amostra constou de 1.536 estudantes, sendo a maior porcentagem do sexo feminino (52,5%). Parte predominante da amostra concentra-se na faixa etária de 13 a 15 anos (39,0%), sendo que 72,1% dos estudantes se encontravam no ensino fundamental. Em Rio Branco, 44,1% dos estudantes apresentaram defasagem escolar, sendo que somente 15,8% da amostra pertenciam às classes sociais A ou B (Tabela 1).
- II – Houve maior porcentagem de estudantes com *uso na vida* que apresentaram defasagem escolar quando comparados aos sem *uso na vida* (exceto tabaco e álcool). Entre os sem *uso na vida* é menor o número de faltas à escola que entre os com *uso na vida*. Não houve diferenças na comparação de presença ou não de *uso na vida* e as classes sociais (Tabela 2).
- III – Em dois tipos de uso (*uso freqüente* e *uso pesado*) houve predomínio estatisticamente significativo para o sexo feminino. Embora nas faixas etárias a partir de 16 a 18 anos apareçam as maiores porcentagens de *uso na vida*, já entre 10 e 12 anos se observa número significativo de estudantes com *uso na vida* de drogas, com 11,0% (Tabela 3).
- IV – As drogas mais utilizadas pelos estudantes, excetuando-se álcool e tabaco, pela ordem foram: solventes, ansiolíticos, maconha e anfetamínicos. O *uso na vida* de energéticos foi de 7,2%. A estimativa total de estudantes com *uso na vida*, nas redes municipal e estadual de ensino em Rio Branco, foi de 19,1% – dados expandidos (Tabela 4).
- V – Houve predomínio de *uso na vida* para o sexo masculino sobre o feminino com diferenças estatisticamente significantes apenas para os energéticos. Na faixa etária de 10 a 12 anos, o uso de solventes aparece com 3,0% do total de estudantes dessa faixa etária (Tabela 5).

Tabela 1: Características sociodemográficas de 1.536 estudantes das redes municipal e estadual de Rio Branco.

| Características | | n | % |
|------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Sexo | Masculino | 588 | 38,3 |
| | Feminino | 807 | 52,5 |
| | Não informado | 141 | 9,2 |
| | Total | 1536 | 100,0 |
| Faixa etária (anos) | 10-12 | 416 | 27,1 |
| | 13-15 | 599 | 39,0 |
| | 16-18 | 337 | 21,9 |
| | > 18 | 49 | 3,2 |
| | Não informado | 135 | 8,8 |
| | Total | 1536 | 100,0 |
| Grau escolar | Fundamental | 1108 | 72,1 |
| | Médio | 428 | 27,9 |
| | Total | 1536 | 100,0 |
| Defasagem série/idade (anos) | Não tem | 723 | 47,1 |
| | 1 a 2 | 550 | 35,8 |
| | ≥ 3 | 128 | 8,3 |
| | Não informado | 135 | 8,8 |
| | Total | 1536 | 100,0 |
| Nível socio-econômico | A | 34 | 2,2 |
| | B | 209 | 13,6 |
| | C | 574 | 37,4 |
| | D | 491 | 32,0 |
| | E | 162 | 10,5 |
| | Não informado | 66 | 4,3 |
| Total | 1536 | 100,0 | |

Tabela 2: O uso na vida de drogas psicotrópicas, segundo características sociais de 1.536 estudantes das redes municipal e estadual de Rio Branco, dados não expandidos.

| Características | | Uso na vida [‡] | | | |
|---|-------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Não | | Sim | |
| | | n | % | n | % |
| Defasagem série/idade (anos) | Não tem | 593 | 47,6 | 130 | 44,8* |
| | 1 a 2 | 437 | 35,1 | 113 | 39,0* |
| | ≥ 3 | 104 | 8,3 | 24 | 8,3 |
| | Não informado | 112 | 9,0 | 23 | 7,9 |
| | Total | 1246 | 100,0 | 290 | 100,0 |
| Dias em que faltou à escola nos últimos 30 dias | Vim todos os dias | 809 | 64,9 | 143 | 49,3* |
| | 1 a 3 | 315 | 25,3 | 99 | 34,1* |
| | 4 a 8 | 39 | 3,1 | 20 | 6,9* |
| | ≥ 9 | 22 | 1,8 | 11 | 3,8* |
| | Não informado | 61 | 4,9 | 17 | 5,9 |
| Total | 1246 | 100,0 | 290 | 100,0 | |
| Nível socio-econômico [°] | A | 25 | 2,0 | 9 | 3,1 |
| | B | 166 | 13,3 | 43 | 14,8 |
| | C | 451 | 36,2 | 123 | 42,4 |
| | D | 411 | 33,0 | 80 | 27,6 |
| | E | 136 | 10,9 | 26 | 9,0 |
| | Não informado | 57 | 4,6 | 9 | 3,1 |
| Total | 1246 | 100,0 | 290 | 100,0 | |

[‡] Para definição de *uso na vida*, vide Metodologia.

* Diferença estatisticamente significativa entre *uso na vida*: não e sim. (Teste do χ^2 , $p < 0,05$).

[°] As chaves neste item indicam os agrupamentos feitos para a análise estatística.

Tabela 3: Uso de drogas psicotrópicas em geral (exceto tabaco e álcool) entre 1.536 estudantes do ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual de Rio Branco; dados expressos em porcentagem, levando-se em conta os tipos de usos, conforme sexo e idade.

| Tipos de usos [◇] | Sexo% [‡] | | | Idade (anos)% [‡] | | | | |
|----------------------------|--------------------|------|-----------------|----------------------------|-------|-------|------|-----------------|
| | M | F | NI [□] | 10-12 | 13-15 | 16-18 | > 18 | NI [□] |
| <i>Uso na vida</i> | 19,9 | 18,5 | 19,3 | 11,0 | 21,2 | 19,5 | 22,9 | 17,8 |
| <i>Uso no ano</i> | 15,4 | 16,6 | 16,3 | 9,8 | 17,8 | 17,8 | 16,7 | 16,0 |
| <i>Uso no mês</i> | 11,9 | 11,8 | 11,6 | 7,2 | 13,3 | 13,2 | 7,3 | 10,8 |
| <i>Uso freqüente</i> | 0,9 | 2,6 | 1,0 | 0,6 | 2,9 | 1,7 | 1,0 | 1,0 |
| <i>Uso pesado</i> | 0,2 | 1,9 | 0,0 | 0,2 | 1,9 | 1,2 | 1,0 | 0,0 |

[◇] Para definição de tipos de usos, vide Metodologia.

[‡] As porcentagens representam os dados expandidos (vide Metodologia); a diferença para 100% em cada tipo de uso representa não-usuários para o mesmo tipo de uso.

[□] NI significa dados não informados pelos alunos.

Tabela 4: Uso de drogas psicotrópicas por 1.536 estudantes do ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual de Rio Branco; dados expressos em porcentagem, levando-se em conta as categorias e as diferentes drogas individualmente.

| Drogas | Tipos de uso % [‡] | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|------------------|-------------------|
| | <i>Na vida</i> | <i>No ano</i> | <i>No mês</i> | <i>Frequente</i> | <i>Uso pesado</i> |
| Maconha | 3,8 | 3,3 | 1,9 | 0,3 | 0,1 |
| Cocaína | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,1 | 0,1 |
| Crack | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Anfetamínicos | 3,4 | 2,6 | 1,8 | 0,4 | 0,3 |
| Solventes | 12,1 | 10,9 | 7,7 | 1,0 | 0,6 |
| Ansiolíticos | 3,9 | 3,8 | 2,2 | 0,1 | 0,0 |
| Anticolinérgicos | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| Barbitúricos | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Opiáceos | 0,3 | – [†] | – | – | – |
| Xaropes | 0,3 | – | – | – | – |
| Alucinógenos | 0,2 | – | – | – | – |
| Orexígenos | 0,4 | – | – | – | – |
| Energéticos | 7,2 | – | – | – | – |
| Esteróides/Anabolizantes | 0,1 | – | – | – | – |
| Total tipos de uso• | 19,1 | 16,1 | 11,7 | 1,8 | 1,1 |
| Tabaco | 27,9 | 18,0 | 10,0 | 2,6 | 1,7 |
| Álcool | 55,3 | 53,9 | 35,7 | 6,2 | 3,5 |

[‡] As porcentagens representam os dados expandidos (vide Metodologia).

[†] O traço (–) indica dados não colhidos.

• Tipos de uso exclui tabaco e álcool. Vide definição de tipos de uso em Metodologia.

Tabela 5: *Uso na vida* de drogas psicotrópicas por 1.536 estudantes do ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual de Rio Branco; dados expressos em porcentagem, levando-se em conta sexo, idade e as diferentes drogas individualmente.

| Drogas | Sexo % [‡] | | | Idade (anos) % [‡] | | | | |
|--------------------------|---------------------|------|-----------------|-----------------------------|-------|-------|------|-----------------|
| | M | F | NI [□] | 10-12 | 13-15 | 16-18 | > 18 | NI [□] |
| Maconha | 2,9 | 2,7 | 4,0 | 0,0 | 2,2 | 2,6 | 8,3 | 5,0 |
| Cocaína | 0,8 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
| Crack | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Anfetamínicos | 2,0 | 2,6 | 2,3 | 0,3 | 2,3 | 2,6 | 2,1 | 1,0 |
| Solventes | 6,6 | 5,1 | 5,7 | 3,0 | 6,9 | 5,0 | 6,3 | 5,3 |
| Ansiolíticos | 2,2 | 2,8 | 1,4 | 0,7 | 2,6 | 3,1 | 1,0 | 0,4 |
| Anticolinérgicos | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Barbitúricos | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 1,0 | 0,0 |
| Opiáceos | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| Xaropes | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Alucinógenos | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Orexígenos | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| Energéticos | 6,7 | 3,7* | 6,0 | 0,1 | 4,4 | 5,9 | 9,4 | 5,0 |
| Esteróides/Anabolizantes | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Total tipos de uso• | 11,8 | 10,2 | 9,4 | 4,1 | 12,0 | 9,6 | 16,7 | 8,7 |
| Tabaco | 17,8 | 17,2 | 15,0 | 2,3 | 18,6 | 17,5 | 27,1 | 16,0 |
| Álcool | 31,2 | 32,5 | 26,0 | 15,8 | 32,4 | 35,8 | 43,8 | 26,3 |

[‡] As porcentagens representam os dados expandidos (vide Metodologia).

[□] NI significa dados não informados pelos alunos.

• Para definição para tipos de uso, vide Metodologia.

* Diferença estatisticamente significante entre os dois sexos (Teste do χ^2 , $p < 0,05$).